

Enquête FLAHS 2011

*French League Against Hypertension Survey
(FLAHS)*

L'hypertension au cours de la vie des femmes

Pr Xavier Girerd,
Responsable scientifique des enquêtes FLAHS
Au nom du CFLHTA

Enquêtes FLAHS

French League Against Hypertension Survey

- Les enquêtes FLAHS réalisées par Kantar Health et le CFLHTA ont l'objectif d'obtenir des données scientifiques sur le mode de vie et la prise en charge médicale des hypertendus vivants en France.
- 2001 Stress et hypertension artérielle
- 2002 Activité physique et sportive chez l'hypertendu
- 2004 Les traitements de l'HTA en France
- 2005 Dépistage de l'HTA par l'automesure
- 2006 L'HTA au quotidien en France
- 2007 L'HTA pour vous et votre conjoint
- 2009 L'HTA et l'âge de vos artères
- 2010 HTA et qualité du sommeil
- 2011 HTA de la femme**

Enquête FLAHS 2011

French League Against Hypertension Survey

Fiche technique

Méthodologie Interrogation par voie postale de 2250 femmes de 18 ans et plus représentatif de la population française

Echantillon 1700 femmes de 18 ans et plus


Période de réalisation de l'enquête Juin - Juillet 2011

Matériel d'enquête Questionnaire auto administré de 3 pages

Critères de pondération Redressement effectué sur les 1700 individus répondants sur les critères suivants : région, habitat, CSP, sexe et âge

■ **L'enquête FLASH 2011 a pour objectifs** d'évaluer la prévalence de l'HTA et ce tout au long de la vie de la femme. En particulier l'analyse consistera à décrire les mesures de tension artérielle en fonction des différentes périodes de la vie d'une femme : prise d'un contraceptif oestroprogestatif, grossesse, ménopause. Les données recueillies dans FLAHS 2011 sont comparées avec celles obtenues dans FLAHS 2010.

HTA et comorbidités chez les femmes de 18 à 60 ans – 2011




Base : Femmes de 18 à 60 ans

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités chez les 60 ans et plus – 2011



Base : Ensemble des femmes âgées de 60 ans et plus (n=564)


Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Déclaration d'une grossesse


French League Against Hypertension Survey



Q24 : Avez-vous eu des enfants ?



Déclaration d'une hypertension au cours d'une grossesse et/ou de la prise de pilule

French League Against Hypertension Survey



Q23 : Un médecin vous a-t-il déjà indiqué lors de la prise d'une pilule contraceptive la présence d'une hypertension artérielle
Q26A : Au cours d'au moins une de votre/vos grossesse(s) avez-vous déjà eu de l'hypertension artérielle ?

Complications lors de la/des grossesse(s) – 2011



Tests aux seuils 95 et 99%

	Ensemble zZ	Traités HTA aA	Non Traités HTA bB
Base : Ensemble			
Base	1265	334	924
% horizontal	100,0%	26,4%	73,0%
Au moins une complication dont :	%v	25,5%	17,6%
- 1 seule complication dont :	%v	20,5%	14,5%
HTA	%v	13,4%	4,2%
toxémie	%v	1,1%	0,6%
des complications	%v	6,0%	9,7%
- 2 complications dont :	%v	3,8%	2,6%
HTA et toxémie	%v	0,8%	0,1%
HTA et complications	%v	3,0%	2,4%
toxémie et complications	%v	0,1%	0,1%
- 3 complications	%v	1,3%	0,6%
Aucune complication	%v	68,9%	79,5%

Base : 1265 femmes ayant déjà eu des enfants ou des grossesses

Q26 : Au cours d'au moins une de votre/vos grossesse(s), avez-vous déjà eu...

Enquête FLAHS 2011

Hypertension chez la femme

- 22 % des femmes au sein de cette population déclarent avoir été traitées pour hypertension artérielle.
- Sur l'ensemble de la population, 37 % utilisent actuellement une contraception dont 60 % d'entre elles une contraception orale.
- 7 % des femmes affirment avoir eu de l'hypertension artérielle lors de la prise de la pilule contraceptive.
- 7 % des femmes indiquent avoir été hypertendues lors de leur grossesse.
- 25,5 % des femmes hypertendues déclarent avoir eu au moins une complication durant leur grossesse contre 17,6 % des femmes normotendues.
- Chez les femmes actuellement traitées pour HTA, 13 % ont présenté une HTA lors d'une grossesse et 9 % lors de la prise de pilule contraceptive.
- Chez les femmes ménopausées et traitées pour une HTA, 3,7 % suivent un traitement hormonal substitutif.

HYPERTENSION ARTERI(ELLES)



Femme et hypertension artérielle **une liaison à risque**

Informations et conseils du Comité Français
de Lutte contre l'Hypertension Artérielle

COMITE
FRANCAIS
DE LUTTE CONTRE
L'HYPERTENSION
ARTERIELLE