

Etude HTA Flash 2012

La vie quotidienne de l’hypertendu

9 novembre 2012

Pr. Girerd

Hôpital de la Pitié, Service d'endocrinologie métabolisme

Contact :

Séverine RICARD
☎ 01.40.92.44.33
Severine.ricard@kantarhealth.com

Sommaire

1. PRESENTATION DE L'ETUDE 3
1.1 Contexte et Objectifs 4
1.2 Méthodologie 6
1.3 Aide à la lecture des résultats 8

2. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 10

3. RESULTATS DETAILLES 19
3.1 Hypertension artérielle et traitements 20
3.2 Les comorbidités 80
3.3 Santé et mode de vie 104
3.4 Hypertension artérielle et automesure 135
3.5 Renoncer à certains soins et autres 217

4. ANNEXES 234
4.1 Caractéristiques de l'échantillon 235
4.2 Lettre d'accompagnement 239
4.3 Questionnaire 241

KANTAR HEALTH

1. Présentation de l'étude

KANTAR HEALTH

1.1 Contexte et objectifs

Contexte et objectifs

- Le Comité Français de Lutte contre l'HyperTension Artérielle (CFLHTA) a pour mission de mieux faire connaître les problèmes de l'hypertension artérielle au grand public ainsi qu'auprès des professionnels de santé, avec en tête de liste, les médecins. Parmi les nombreuses actions entreprises pour atteindre ce but figure, notamment, l'organisation d'une journée nationale de lutte contre l'HTA ayant lieu chaque année.

- L'objectif principal de cette étude, tout comme pour les vagues précédentes, est d'évaluer la prévalence de l'hypertension, mais aussi de réaliser un recueil des chiffres tensionnels des individus qui sont en possession d'un appareil d'automesure.

- Par ailleurs, pour sa campagne 2012, le CFLHTA a souhaité approfondir son analyse et a choisi de communiquer sur la qualité du sommeil.

- Les donnés recueillies sur L'HTA dans cette étude sont comparées avec celles obtenues en 2010.

KANTAR HEALTH

1.2 Méthodologie

Méthodologie et échantillon

Mode de recueil	Interrogation par voie postale de 4500 individus de 35 ans et plus représentatif de la population
Echantillon	3462 individus de 35 ans et plus
Matériel d'enquête	Questionnaire auto-administré de 4 pages
Période de réalisation	Mai - Juin 2012
Pondération des données	Redressement effectué sur les 3510 individus répondants sur les critères suivants : région, habitat, CSP, sexe et âge

KANTAR HEALTH

1.3 Aide à la lecture des résultats

Aide à la lecture des résultats

- Les différences significatives au sein d'un tableau sont signifiées comme présenté ci-dessous :

Comparaison cibles	Traités n= A %	Non traités n= B %
• **Différence significative à 5% par rapport à la colonne B**	**36 b**	18
• **Différence significative à 1% par rapport à la colonne A**	33	**66 A**

- Au sein des graphiques :

Différence significative à 5%

Différence significative à 1%

KANTAR HEALTH

2. Synthèse des principaux résultats

Synthèse 2012 – Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle
2012 vs. 2010

- 30% des individus traités pour l'HTA et ce en moyenne depuis environ 10 ans (Médiane : 9 ans)



Non, mais a déjà pris un traitement pour l'hypertension artérielle dans le passé = 3%
Non et n'a jamais pris de traitement pour l'hypertension artérielle = 66%

Base : Ensemble des individus

Synthèse 2012 – Automesure et statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85

- Sur la base de l'automesure au domicile

41% des individus traités sont en possession d'un appareil pour mesurer leur tension.
36%
Le type d'appareil le plus fréquemment utilisé se positionne au niveau du bras.



Synthèse 2012 – HTA et traitement

- Nombre d'antihypertenseurs cités

Ont cité …	Marque ou générique %	Générique %
1 antihypertenseur….....	47%	25%
2 antihypertenseurs.....	35%	3%
3 antihypertenseurs.....	14%	<1%
4 antihypertenseurs.....	4%	<1%
5 antihypertenseurs.....	<1%	-
Aucun produit.....	-	71%

Soit en moyenne, 1.8 médicaments de marque ou générique cités par individu (écart-type : 0.9)

Synthèse 2012 – Les génériques

- 34% des individus traités surestiment le nombre de comprimés génériques pris.

- Ils sont peu nombreux à juger les génériques :
  - Moins efficaces : 13%
  - Moins bien tolérés : 10%

- L'observance des traitements : une moins bonne observance des traitements du diabète



Score de 0 (bonne observance
Score de 1 ou 2 (observance minime)
Score de 3 à 6 (mauvaise observance)

Synthèse 2012 – HTA et Comorbidités (1/2)

- Parmi les 35 ans et plus 40% des individus présentent au moins une pathologie

3462 individus de 35 ans et plus
100%

2068 individus « sains »
60%

1394 ayant au moins une pathologie
40%

1 seule pathologie 816 = 23% dont :

- Hypertension : 15%
- Dyslipidémie : 7%
- Diabète : 1%

2 Pathologies 451 = 13% dont :

- Hypertension et Dyslipidémie : 10%
- Hypertension et Diabète : 2%
- Dyslipidémie et Diabète : 1%

3 Pathologies
127 = 4%

Synthèse 2012 – HTA et Comorbidités (2/2)

Moustique de risque



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Synthèse 2012 – Santé et mode de vie

- Le périmètre abdominal

	Obésité ATP %	Obésité IDF %
Total.....	33%	52% 55%
Traités :.....	49%	68%

Moins d'obésité abdominale IDF en 2012

- L'indice de masse corporelle (BMI*)

Aucune évolution remarquable du BMI entre 2010 et 2012

- Tabagisme

20% des français de 35 ans et plus fument, même très occasionnellement. Aucune évolution de comportement n'est perceptible entre 2010 et 2012

* BMI : Body Mass Index

Synthèse 2012 – Renoncer à des soins

- 18% des individus ont renoncé à certains soins ils sont 21% au sein des patients traités pour HTA

- A renoncé à :

	Total %	Traités HTA %	Non Traités HTA %
Des médicaments	23%	17%	26%
Une consultation	35%	30%	38%
Des soins dentaires, la vue ou l'audition	78%	74%	80%

KANTAR HEALTH

3. Résultats détaillés

KANTAR HEALTH

3.1 Hypertension artérielle et traitements

KANTAR HEALTH

3.1.2 Caractéristiques des individus sous traitement

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – 2012 vs. 2010



Non, mais a déjà pris un traitement pour l'hypertension artérielle dans le passé = **3%**

Non et n'a jamais pris de traitement pour l'hypertension artérielle = **66%**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – 2012 vs. 2010

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité



	Total	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et +	Actifs	Inactifs
Effectifs 2012	3462	1697	1765	862	877	661	566	496	1730	1732
Effectifs 2010	3718	1822	1896	915	937	713	613	540	1845	1873

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – 2012

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Oui	Eff	1054	514	540	48	167	271	281	287	271	783
	%v	*30.4%*	*30.3%*	*30.6%*	*5.6%*	*19.0%*	*41.0%*	*49.8%*	*57.8%*	*15.7%*	*45.2%*
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZEF		HZ
Non, mais vous avez déjà pris un médicament pour l'hypertension artérielle dans le passé	Eff	100	45	55	23	18	22	19	19	36	64
	%v	*2.9%*	*2.7%*	*3.1%*	*2.7%*	*2.0%*	*3.3%*	*3.3%*	*3.9%*	*2.1%*	*3.7%*
	Test										H
Non, vous n'avez jamais pris de traitement pour l'hypertension artérielle	Eff	2287	1128	1160	789	691	364	263	180	1419	868
	%v	*66.1%*	*66.5%*	*65.7%*	*91.5%*	*78.8%*	*55.1%*	*46.5%*	*36.2%*	*82.0%*	*50.1%*
	Test	GIFE			GZFED	GFEZ	GF	G		IZ	
NR	Eff	20	9	11	2	1	4	2	10	4	17
	%v	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.2%*	*0.2%*	*0.6%*	*0.4%*	*2.1%*	*0.2%*	*1.0%*
	Test	hd							DCfze		H
ST Traités	**Eff**	**1054**	**514**	**540**	**48**	**167**	**271**	**281**	**287**	**271**	**783**
	%v	***30.4%***	***30.3%***	***30.6%***	***5.6%***	***19.0%***	***41.0%***	***49.8%***	***57.8%***	***15.7%***	***45.2%***
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZEF		HZ
ST Non traités (hors NR)	**Eff**	**2388**	**1173**	**1215**	**812**	**709**	**386**	**282**	**199**	**1456**	**932**
	%v	***69.0%***	***69.1%***	***68.8%***	***94.1%***	***80.8%***	***58.5%***	***49.8%***	***40.1%***	***84.1%***	***53.8%***
	Test	GIFE			GZFED	GFEZ	GF	G		IZ	
ST Déjà traités	**Eff**	**1154**	**560**	**595**	**72**	**184**	**293**	**300**	**306**	**307**	**847**
	%v	***33.3%***	***33.0%***	***33.7%***	***8.3%***	***21.0%***	***44.3%***	***53.0%***	***61.7%***	***17.8%***	***48.9%***
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZEF		HZ

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – Rappel 2010

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

		Sexe		Age					PCS Individu	
	TOTAL	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	3718	1822	1896	915	937	713	613	540	1845	1873
% horizontal	*100,0%*	*49,0%*	*51,0%*	*24,6%*	*25,2%*	*19,2%*	*16,5%*	*14,5%*	*49,6%*	*50,4%*
Oui	*31,4%* AB	*31,3%*	*31,6%*	*5,9%*	*19,7%* A	*42,1%* ABZ	*50,9%* ABZC	*58,9%* ABZCD	*16,3%*	*46,4%* AZ
Non, mais vous avez déjà pris un médicament pour l'hypertension artérielle dans le passé	*3,1%*	*2,5%*	*3,6%* a	*2,4%*	*2,7%*	*2,3%*	*3,1%*	*5,9%* CABZd	*2,5%*	*3,6%* a
Non, vous n'avez jamais pris de traitement pour l'hypertension artérielle	*64,7%* EDC	*65,5%*	*63,9%*	*91,5%* EZDCB	*76,6%* EDCZ	*54,6%* ED	*45,3%* E	*34,1%*	*80,7%* BZ	*48,9%*
Non précisé	*0,8%* a	*0,8%*	*0,8%*	*0,3%*	*1,1%* a	*1,0%*	*0,7%*	*1,1%*	*0,5%*	*1,1%*
Traités pour l'HTA actuellement	***31,4%* AB**	***31,3%***	***31,6%***	***5,9%***	***19,7%* A**	***42,1%* ABZ**	***50,9%* ABZC**	***58,9%* ABZCD**	***16,3%***	***46,4%* AZ**
Non traités pour l'HTA actuellement	***68,6%* EDC**	***68,7%***	***68,4%***	***94,1%* EZDCB**	***80,3%* EDCZ**	***57,9%* ED**	***49,1%* E**	***41,1%***	***83,7%* BZ**	***53,6%***

Base : Ensemble des individus

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – 2012

Analyse selon le BMI



BMI moyen chez les individus <u>traités</u> (ET)	**28,0(5,30)**
BMI moyen chez les individus <u>non traités</u> (ET)	**25,2 (4,51)**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q20 : Quel est votre taille?

Q21 : Quel est votre poids?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – Rappel 2010

Analyse selon le BMI



BMI moyen chez les individus <u>traités</u> (ET)	**28.0 (5.4)**
BMI moyen chez les individus <u>non traités</u> (ET)	**25.3 (4.5)**

Base : Ensemble des individus

Q11 : Quel est votre taille?

Q12 : Quel est votre poids?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – 2012

Analyse selon le BMI

	Total des 35 ans et plus n = 3462	Individus traités n = 1054 A	Individus non traités n = 2388 B
• BMI moyen	26.0	28.0 B	25.2
• Ecart-type	4.94	5.30	4.51
• Médiane	25.3	27.1	24.5
• Min / Max	13.1 / 55.7	16.4 / 55.5	13.1 / 54
• Sous total BMI ≥ 30	18%B	30% B	13%

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Prise d'un médicament pour l'hypertension artérielle – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

	Total des 35 ans et plus n = 3718	Individus traités n = 1169 A	Individus non traités n = 2549 B
• BMI moyen.....	26.2	28,0 B	25,3
• Ecart-type	4,9	5,4	4,5
• Médiane.....	25,5	27,3	24,6
• Min / Max	11.8 / 57.5	16.0 / 57.5	11.8 / 56.7
• Sous total BMI ≥ 30.....	18%	29% B	13%

Base : Ensemble des individus

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ?

Ancienneté du traitement antihypertenseur – 2012



Ancienneté moyenne en **<u>années</u>** (ET):10,3 (8,39)
Médiane 9,2

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q3 : Depuis combien de temps prenez-vous un traitement pour traiter l'hypertension artérielle ?

Ancienneté du traitement antihypertenseur – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS individu: Actifs Hh	PCS individu: Inactifs Ii
	TOTAL										
ST Moins de 2 ans	Eff	100	59	41	6	19	30	24	20	36	65
	%v	9.5%	11.5%	7.8%	12.0%	12.6%	11.9%	9.4%	7.7%	13.1%	8.2%
	Test		b							i	
ST 2 a - de 5 ans	Eff	173	78	98	10	38	41	38	48	56	119
	%v	16.7%	15.2%	18.1%	20.1%	25.0%	16.2%	15.0%	18.4%	20.0%	15.2%
	Test					h				i	
ST 5 a - de 10 ans	Eff	214	116	98	7	28	69	54	56	58	156
	%v	20.7%	22.6%	18.1%	14.0%	18.9%	27.3%	21.3%	21.8%	21.4%	19.9%
	Test						dc				
ST 10 a - de 20 ans	Eff	306	148	157	19	53	72	96	64	82	223
	%v	29.6%	28.7%	29.2%	40.1%	35.0%	28.5%	37.9%	25.2%	30.4%	28.4%	
	Test	g			g	g		Ga			
ST 20 ans et +	Eff	164	73	90	3	11	38	41	71	16	147
	%v	15.9%	14.2%	16.8%	6.1%	6.9%	14.8%	16.2%	28.0%	5.9%	18.8%
	Test	HDC					Dc	Dc	DCEF		H
NR	Eff	96	40	55	3	17	21	28	27	22	74
	%v	9.1%	7.9%	10.3%	5.9%	10.0%	7.8%	10.0%	9.4%	8.3%	9.4%
	Test										
Moy.		10.32	9.85	10.79	8.60	8.22	10.21	10.67	11.61	7.96	11.15
Ect.		8.39	8.19	8.56	6.14	6.58	8.80	8.06	9.25	6.36	8.85
Mediane		9.17	8.58	10.00	9.22	7.15	8.00	10.00	10.00	7.00	10.00
Mini		0.08	0.08	0.08	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Maxi		40.00	40.00	40.00	26.00	27.00	40.00	40.00	40.00	32.00	40.00
Base de la moyenne		958	474	484	46	150	250	253	260	248	710
Test		HD					d	Dc	DCz		H

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q3 : Depuis combien de temps prenez-vous un traitement pour traiter l'hypertension artérielle ?

Ancienneté du traitement antihypertenseur – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 26 Aa	26 à 27.9 Bb	28 à 28.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		1054	316	299	124	312	3**
% horizontal		100.0%	30.0%	28.4%	11.8%	29.6%	0.3%
ST Moins de 2 ans	Eff	100	36	26	15	21	1
	%v	9.5%	11.4%	8.8%	12.3%	6.8%	42.2%
	Test		d				
ST 2 à - de 5 ans	Eff	176	63	46	23	44	
	%v	16.7%	19.8%	15.3%	18.9%	14.2%	
	Test						
ST 5 à - de 10 ans	Eff	214	63	77	19	54	1
	%v	20.3%	19.8%	25.7%	15.3%	17.3%	31.2%
	Test			dc			
ST 10 à - de 20 ans	Eff	305	82	83	39	102	
	%v	28.9%	25.9%	27.7%	31.3%	32.6%	
	Test						
ST 20 ans et +	Eff	164	44	44	15	60	
	%v	15.5%	14.0%	14.6%	12.5%	19.3%	
	Test						
NR	Eff	96	29	23	12	31	1
	%v	9.1%	9.1%	7.8%	9.8%	9.9%	26.6%
	Test						

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q3 : Depuis combien de temps prenez-vous un traitement pour traiter l'hypertension artérielle ?

Ancienneté du traitement antihypertenseur – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	3 pathologies: Total Ll
Base		1054	1054	518	518	409	354	55*	127
% horizontal		100.0%	100.0%	49.2%	49.2%	38.8%	33.6%	5.2%	12.1%
	Test								
ST Moins de 2 ans	Eff	100	100	58	58	30	28	2	12
	%v	9.5%	9.5%	11.2%	11.2%	7.4%	7.9%	3.9%	9.3%
	Test	j	j	jh	jh				
ST 2 a - de 5 ans	Eff	176	176	98	98	55	48	8	22
	%v	16.7%	16.7%	18.9%	18.9%	13.6%	13.5%	13.9%	17.5%
	Test			hl	hl				
ST 5 a - de 10 ans	Eff	214	214	102	102	95	83	11	17
	%v	20.3%	20.3%	19.7%	19.7%	23.2%	23.5%	21.0%	13.3%
	Test	l	l			L	L		
ST 10 a - de 20 ans	Eff	305	305	144	144	122	103	19	39
	%v	28.9%	28.9%	27.8%	27.8%	29.9%	29.0%	35.5%	30.4%
	Test								
ST 20 ans et +	Eff	164	164	69	69	73	63	10	21
	%v	15.5%	15.5%	13.3%	13.3%	18.0%	17.9%	18.1%	16.6%
	Test								
NR	Eff	96	96	47	47	33	29	4	16
	%v	9.1%	9.1%	9.0%	9.0%	8.0%	8.1%	7.6%	12.9%
	Test								

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

KANTAR HEALTH

3.1.3 Les catégories de médicaments cités

Abréviations utilisées

αB	=	Alpha Bloquant
BB	=	Bêta Bloquant
IC	=	Inhibiteur Calcique
IEC	=	Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion
D	=	Diurétique
IA II	=	Inhibiteur de l'Angiotensine II
CX ou Central	=	Antihypertenseur d'action Centrale
IDR	=	Inhibiteur direct de la Rénine
ANTIALDO	=	Anti-aldostérones

Les médicaments cités*– 2012
Sans associations fixes

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1698	*100,0%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**1637**	***96,4%***
Bêtabloquants	402	*23,7%*
IEC	250	*14,7%*
Inhibiteur calcique	306	*18,0%*
CENTRAL	43	*2,5%*
Alphabloquant	28	*1,7%*
Inhibiteur de l'angiotensine II	484	*28,5%*
Diurétiques	393	*23,1%*
IDR	13	*0,8%*
ANTIALDO	48	*2,8%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**49**	***2,9%***
ST Spécialités diverses	**12**	***0,7%***
ST GENERIQUES	**355**	***20,9%***
dont ST GENERIQUES HTA	**353**	***20,8%***
dont Bêtabloquants	113	*6,7%*
dont IEC	96	*5,7%*
dont Inhibiteur calcique	66	*3,9%*
dont CENTRAL	20	*1,2%*
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	14	*0,8%*
dont Diurétiques	15	*0,9%*
dont ANTIALDO	31	*1,8%*
dont ST Problèmes cardio vasculaires	**2**	***0,1%***

Base : Nombre de médicaments pour l'HTA cité

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Les médicaments cités*– 2012

Avec associations fixes

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1698	100,0%
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**1305**	**76,9%**
Bêtabloquants	363	21,4%
IEC	174	10,2%
Inhibiteur calcique	237	14,0%
CENTRAL	43	2,5%
Alphabloquant	28	1,7%
Inhibiteur de l'angiotensine II	273	16,1%
Diurétiques	130	7,7%
IDR	8	0,5%
ANTIALDO	48	2,8%
ST Problèmes cardio vasculaires	**49**	**2,9%**
ST Spécialités diverses	**12**	**0,7%**
ST Associations fixes	**331**	**19,5%**
IEC + diurétique	54	3,2%
Betabloquant + Autre	3	0,1%
Betabloquant + diurétique	30	1,7%
Betabloquant + IC	7	0,4%
IA II + diurétique	174	10,2%
IA II+IC	37	2,2%
Diurétique + Autre	5	0,3%
IEC + inhibiteur calcique	22	1,3%
ST GENERIQUES	**355**	**20,9%**
dont ST GENERIQUES HTA	**352**	**20,7%**
dont Bêtabloquants	113	6,7%
dont IEC	94	5,5%
dont Inhibiteur calcique	66	3,9%
dont CENTRAL	20	1,2%
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	14	0,8%
dont Diurétiques	13	0,8%
dont ANTIALDO	31	1,8%
dont ST Problèmes cardio vasculaires	**2**	**0,1%**
dont ST Associations fixes	**2**	**0,1%**
dont IEC + diurétique	2	0,1%

Base : Nombre de médicaments pour l'HTA cité

KANTAR HEALTH

3.1.4 Les traitements selon le nombre de médicaments cités

Nombre d'antihypertenseurs cités – 2012

Ont cité …	n= 1054	%
• 1 antihypertenseur	491	47
• 2 antihypertenseurs	367	35
• 3 antihypertenseurs	145	14
• 4 antihypertenseurs	41	4
• 5 antihypertenseurs	8	<1
• 6 antihypertenseurs	2	<1

Soit en moyenne, 1,8 médicaments cités par individu (écart-type : 0,9)

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA (n=1054)

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs cités – Rappel 2010

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1169	*100,0%*
1 molécule	551	*47,1%*
2 molécules	408	*34,9%*
3 molécules	160	*13,7%*
4 molécules	44	*3,7%*
5 molécules	7	*0,6%*
Moy. et ect	1,74	0,90
Base de la moyenne	1169	

Soit en moyenne, 1,6 médicaments cités par individu (écart-type : 0,9)

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs – 2012

Analyse selon le sexe

Ont cités...	Total n = 1054 %	Hommes n = 514 %	Femmes n = 540 %
• 1 antihypertenseur	63	63	64
• 2 antihypertenseurs.....	27	27	27
• 3 antihypertenseurs.....	7	8	7
• 4 antihypertenseurs.....	2	2	2
• 5 antihypertenseurs.....	<1	<1	1
• 6 antihypertenseurs.....	<1	1	<1
Nombre moyen (0 inclus)	*1,5*	*1,5*	*1,5*
Ecart type	*0.8*	*0.8*	*0.8*

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs cités – Rappel 2010

Analyse selon le sexe

			Sexe	
		TOTAL	Homme	Femme
Tests aux seuils 95 et 99%		zZ	aA	bB
Base		**1169**	**570**	**599**
% horizontal		*100,0%*	*48,8%*	*51,2%*
1 molécule	%v	*47,1%*	*45,9%*	*48,3%*
2 molécules	%v	*34,9%*	*35,5%*	*34,2%*
3 molécules	%v	*13,7%*	*13,7%*	*13,7%*
4 molécules	%v	*3,7%*	*4,1%*	*3,3%*
5 molécules	%v	*0,6%*	*0,7%*	*0,5%*
Moy.		1,7	1,8	1,7
Ect.		0,9	0,9	0,9
Médiane		2,0	2,0	2,0
Mini				
Maxi		5,0	5,0	5,0
Base de la moyenne		1169	570	599
Test				

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs – 2012

Analyse selon l'âge

Ont cités...	Total n = 1054 %	35 – 44 ans n = 48 A %	45 – 54 ans n = 167 B %	55 – 64 ans n = 271 C %	65 – 74 ans n = 281 D %	75 ans et plus n = 287 E %
• 1 antihypertenseur	63	86EDZCb	73 EDZ	65e	60	56
• 2 antihypertenseurs	27	11	25a	27A	28A	29A
• 3 antihypertenseurs	3	1	6B	10Ba	11Bac	3
• 4 antihypertenseurs	2	12	-	-	2	2
• 5 antihypertenseurs	<1	<1	-	-	<1	<1
• 6 antihypertenseurs	<1	<1	-	-	<1	<1

Nombre moyen (0 inclus)	*1,5*	*1,50*	*1,2*	*1,3*	*1,5*	*1,6*
Ecart type	*0,8*	*0,8*	*0,5*	*0,5*	*0,8*	*0,8*

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs – Rappel 2010

Analyse selon l'âge

			Age				
		TOTAL	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus
Tests aux seuils 95 et 99%		zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base		**1169**	**54***	**185**	**300**	**312**	**318**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
1 molécule	%v	*47,1%*	*53,7%*	*55,7%*	*50,5%*	*47,2%*	*37,8%*
		E		E	E		
2 molécules	%v	*34,9%*	*33,0%*	*35,5%*	*35,7%*	*31,9%*	*36,9%*
3 molécules	%v	*13,7%*	*8,6%*	*8,7%*	*9,8%*	*15,6%*	*19,3%*
		bc				bc	BCaz
4 molécules	%v	*3,7%*	*2,6%*		*3,6%*	*4,8%*	*5,2%*
5 molécules	%v	*0,6%*	*2,1%*		*0,4%*	*0,6%*	*0,8%*
Moy.		1,7	1,6	1,5	1,7	1,8	1,9
Ect.		0,9	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9
Médiane		2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Mini							
Maxi		5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0
Base de la moyenne		1169	54	185	300	312	318
Test		B			b	B	BCZad

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs génériqués cités – 2012

Ont cité …	%
• 1 antihypertenseur	25
• 2 antihypertenseurs.....	3
• 3 antihypertenseurs.....	1
• 4 antihypertenseurs.....	<1
• Aucun générique.....	71

Soit en moyenne, 0,3 médicaments cités par individu (écart-type : 0,6)

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA (n=1054)

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs génériqués – 2012

Analyse selon le sexe

Ont cités...	Total n = 1054 %	Hommes n = 514 %	Femmes n = 540 %
• 1 antihypertenseur	25	26	24
• 2 antihypertenseurs.....	3	3	3
• 3 antihypertenseurs.....	1	1	<1
• 4 antihypertenseurs.....	<1	-	<1
• 5 antihypertenseurs.....	-	-	-
• 6 antihypertenseurs.....	-	-	-
• Aucun	71	70	73

Nombre moyen (0 inclus)	*0.3*	*0.4*	*0.3*
Ecart type	*0.6*	*0.6*	*0.6*

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Nombre d'antihypertenseurs génériqués – 2012

Analyse selon l'âge

Ont cités...	Total n = 1054 %	35 – 44 ans n = 48 A %	45 – 54 ans n = 167 B %	55 – 64 ans n = 271 C %	65 – 74 ans n = 281 D %	75 ans et plus n = 287 E %
• 1 antihypertenseur	25	14	30	23	25	26
• 2 antihypertenseurs	3	-	-	4	3	4
• 3 antihypertenseurs	1	-	-	1	1	1
• 4 antihypertenseurs	<1	-	-	<1	-	-
• 5 antihypertenseurs	-	-	-	-	-	-
• 6 antihypertenseurs	-	-	-	-	-	-
• Aucun	71	86	70	72	71	69

Nombre moyen (0 inclus)	*0.3*	*0.1*	*0.3*	*0.4*	*0.3*	*0.4*
Ecart type	*0.6*	*0.4*	*0.5*	*0.6*	*0.6*	*0.6*

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Détail des classes thérapeutiques – 2012

1 seul médicament pris pour l'HTA

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1054	*100.0%*
ST 1 Molécule	**491**	***46.6%***
Bêtabloquants	127	*12.1%*
IEC	84	*7.9%*
Inhibiteur calcique	70	*6.7%*
CENTRAL	6	*0.5%*
Alphabloquant	1	*0.1%*
IA II	159	*15.1%*
Diurétiques	29	*2.8%*
IDR	4	*0.4%*
ANTIALDO	11	*1.1%*

NB : La différence entre la somme des effectifs et la base totale est issue du redressement

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Détail des classes thérapeutiques – 2012

2 médicaments pris pour l'HTA

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1054	*100.0%*
ST 2 Molécules	**367**	***34.8%***
Bêtabloquants & IEC	37	*3.5%*
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique	22	*2.1%*
Bêtabloquants & CENTRAL	2	*0.2%*
Bêtabloquants & Alphabloquant	1	*0.1%*
Bêtabloquants & IA II	27	*2.5%*
Bêtabloquants & Diurétiques	35	*3.3%*
Bêtabloquants & ANTIALDO	13	*1.2%*
IEC & Inhibiteur calcique	16	*1.5%*
IEC & Alphabloquant	1	*0.1%*
IEC & Diurétiques	40	*3.8%*
IEC & ANTIALDO	2	*0.2%*
Inhibiteur calcique & CENTRAL	3	*0.2%*
Inhibiteur calcique & IA II	51	*4.8%*
Inhibiteur calcique & Diurétiques	7	*0.6%*
Inhibiteur calcique & ANTIALDO	2	*0.2%*
CENTRAL & IA II	3	*0.3%*
Alphabloquant & IA II	2	*0.2%*
Alphabloquant & IDR	1	*0.1%*
Alphabloquant & ANTIALDO	2	*0.2%*
IA II & Diurétiques	100	*9.5%*
IA II & ANTIALDO	2	*0.2%*
Diurétiques & IDR	2	*0.2%*

NB : La différence entre la somme des effectifs et la base totale est issue du redressement

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Détail des classes thérapeutiques – 2012

3 médicaments pris pour l'HTA

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
ST 3 Molécules	**145**	***13.8%***
Bêtabloquants & IEC & Inhibiteur calcique	8	*0.8%*
Bêtabloquants & IEC & Diurétiques	14	*1.3%*
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & CENTRAL	1	*0.1%*
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & IA II	12	*1.2%*
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & Diurétiques	2	*0.2%*
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & ANTIALDO	1	*0.1%*
Bêtabloquants & CENTRAL & Alphabloquant	1	*0.1%*
Bêtabloquants & CENTRAL & IA II	1	*0.1%*
Bêtabloquants & CENTRAL & Diurétiques	1	*0.1%*
Bêtabloquants & Alphabloquant & IA II	1	*0.1%*
Bêtabloquants & IA II & Diurétiques	33	*3.1%*
Bêtabloquants & IA II & IDR	2	*0.1%*
Bêtabloquants & IA II & ANTIALDO	2	*0.2%*
Bêtabloquants & Diurétiques & IDR	1	*0.1%*
Bêtabloquants & Diurétiques & ANTIALDO	1	*0.1%*
IEC & Inhibiteur calcique & Alphabloquant	2	*0.2%*
IEC & Inhibiteur calcique & Diurétiques	14	*1.3%*
IEC & Alphabloquant & Diurétiques	1	*0.1%*
IEC & IA II & Diurétiques	1	*0.1%*
Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II	2	*0.2%*
Inhibiteur calcique & Alphabloquant & IA II	3	*0.3%*
Inhibiteur calcique & Alphabloquant & Diurétiques	1	*0.1%*
Inhibiteur calcique & IA II & Diurétiques	33	*3.2%*
Inhibiteur calcique & Diurétiques & IDR	1	*0.1%*
Inhibiteur calcique & Diurétiques & ANTIALDO	1	*0.1%*
CENTRAL & IA II & Diurétiques	3	*0.3%*
CENTRAL & Diurétiques & IDR	1	*0.1%*
Alphabloquant & IA II & Diurétiques	1	*0.1%*
IA II & Diurétiques & ANTIALDO	2	*0.2%*

NB : La différence entre la somme des effectifs et la base totale est issue du redressement

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Détail des classes thérapeutiques – 2012

4 médicaments pris pour l'HTA

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
ST 4 Molécules	41	3.9%
Bêtabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & Diurétiques	5	0.5%
Bêtabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & IDR	1	0.1%
Bêtabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & ANTIALDO	1	0.1%
Bêtabloquants & IEC & IA II & Diurétiques	1	0.1%
Bêtabloquants & IEC & Diurétiques & ANTIALDO	1	0.1%
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II	1	0.1%
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & Alphabloquant & IA II	1	0.1%
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & IA II & Diurétiques	11	1.1%
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & Diurétiques & IDR	1	0.1%
Bêtabloquants & Inhibiteur calcique & Diurétiques & ANTIALDO	2	0.2%
Bêtabloquants & CENTRAL & IA II & Diurétiques	4	0.4%
Bêtabloquants & Alphabloquant & IA II & Diurétiques	2	0.2%
Bêtabloquants & IA II & Diurétiques & ANTIALDO	1	0.1%
IEC & Inhibiteur calcique & CENTRAL & Diurétiques	1	0.1%
IEC & Inhibiteur calcique & IA II & Diurétiques	2	0.1%
Inhibiteur calcique & CENTRAL & Alphabloquant & ANTIALDO	1	0.1%
Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II & Diurétiques	5	0.4%
Inhibiteur calcique & Alphabloquant & IA II & Diurétiques	1	0.1%
Inhibiteur calcique & IA II & Diurétiques & ANTIALDO	1	0.1%
CENTRAL & Alphabloquant & IA II & Diurétiques	1	0.1%

NB : La différence entre la somme des effectifs et la base totale est issue du redressement

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Détail des classes thérapeutiques – 2012

5 et 6 médicaments pris pour l'HTA

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
ST 5 Molécules	**8**	***0.7%***
Bétabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & CENTRAL & Diurétiques	1	*0.1%*
Bétabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & Alphabloquant & Diurétiques	1	*0.1%*
Bétabloquants & Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II & Diurétiques	1	*0.1%*
Bétabloquants & Inhibiteur calcique & CENTRAL & Diurétiques & IDR	1	*0.1%*
Bétabloquants & Inhibiteur calcique & Alphabloquant & IA II & Diurétiques	2	*0.1%*
Bétabloquants & Alphabloquant & IA II & Diurétiques & ANTIALDO	2	*0.2%*
IEC & Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II & Diurétiques	1	*0.1%*
ST 6 Molécules	**2**	***0.2%***
Bétabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & CENTRAL & IA II & Diurétiques	1	*0.1%*
Bétabloquants & IEC & Inhibiteur calcique & Alphabloquant & Diurétiques & ANTIALDO	1	*0.1%*

NB : La différence entre la somme des effectifs et la base totale est issue du redressement

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

KANTAR HEALTH

3.1.5 Les traitements spécifiques pour l'HTA

Les médicaments cités– 2012
Sans associations fixes

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1054	*100,0%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**1054**	***100,0%***
Bêtabloquants	382	*36,2%*
IEC	234	*22,2%*
Inhibiteur calcique	292	*27,7%*
CENTRAL	39	*3,7%*
Alphabloquant	27	*2,6%*
Inhibiteur de l'angiotensine II	474	*45,0%*
Diurétiques	368	*34,9%*
IDR	13	*1,3%*
ANTIALDO	47	*4,4%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**38**	***3,6%***
ST Spécialités diverses	**12**	***1,1%***
ST GENERIQUES	**306**	***29,0%***
dont ST GENERIQUES HTA	**304**	***28,8%***
dont Bêtabloquants	113	*10,7%*
dont IEC	93	*8,8%*
dont Inhibiteur calcique	66	*6,3%*
dont CENTRAL	20	*1,9%*
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	14	*1,3%*
dont Diurétiques	15	*1,4%*
dont ANTIALDO	31	*3,0%*
dont ST Problèmes cardio vasculaires	**2**	***0,2%***

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Classe d'antihypertenseurs – 2012

Analyse selon le sexe - Sans associations fixes

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Sexe Homme aA	Sexe Femme bB
Base		**1054**	**514**	**540**
% horizontal		*100,0%*	*48,8%*	*51,2%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**Eff**	**1054**	**514**	**540**
	%v	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***
	Test			
Bêtabloquants	Eff	382	182	200
	%v	*36,2%*	*35,3%*	*37,1%*
	Test			
IEC	Eff	234	129	105
	%v	*22,2%*	*25,1%*	*19,4%*
	Test		b	
Inhibiteur calcique	Eff	292	157	135
	%v	*27,7%*	*30,6%*	*24,9%*
	Test	DHC	b	
CENTRAL	Eff	39	22	17
	%v	*3,7%*	*4,2%*	*3,2%*
	Test	hd		
Alphabloquant	Eff	27	8	20
	%v	*2,6%*	*1,5%*	*3,6%*
	Test	H		a
Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	474	242	232
	%v	*45,0%*	*47,1%*	*43,0%*
	Test			
Diurétiques	Eff	368	171	198
	%v	*34,9%*	*33,2%*	*36,6%*
	Test	Ch		
IDR	Eff	13	5	8
	%v	*1,3%*	*1,0%*	*1,5%*
	Test			
ANTIALDO	Eff	47	11	36
	%v	*4,4%*	*2,2%*	*6,6%*
	Test	a		A

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Sexe Homme aA	Sexe Femme bB
Base		**1054**	**514**	**540**
% horizontal		*100,0%*	*48,8%*	*51,2%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**Eff**	**38**	**16**	**22**
	%v	***3,6%***	***3,2%***	***4,0%***
	Test			
ST Spécialités diverses	**Eff**	**12**	**4**	**8**
	%v	***1,1%***	***0,8%***	***1,5%***
	Test			
ST GENERIQUES	**Eff**	**306**	**156**	**150**
	%v	***29,0%***	***30,3%***	***27,8%***
	Test	**C**		
dont ST GENERIQUES HTA	**Eff**	**304**	**156**	**148**
	%v	***28,8%***	***30,3%***	***27,4%***
	Test	**C**		
dont Bêtabloquants	Eff	113	60	53
	%v	*10,7%*	*11,6%*	*9,9%*
	Test			
dont IEC	Eff	93	55	38
	%v	*8,8%*	*10,6%*	*7,1%*
	Test		b	
dont Inhibiteur calcique	Eff	66	34	32
	%v	*6,3%*	*6,5%*	*6,0%*
	Test			
dont CENTRAL	Eff	20	11	10
	%v	*1,9%*	*2,1%*	*1,8%*
	Test	h		
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	14	5	9
	%v	*1,3%*	*1,0%*	*1,6%*
	Test			
dont Diurétiques	Eff	15	8	7
	%v	*1,4%*	*1,6%*	*1,3%*
	Test			
dont ANTIALDO	Eff	31	9	22
	%v	*3,0%*	*1,8%*	*4,1%*
	Test			a
vasculaires	**Eff**	**2**		**2**
	%v	***0,2%***		***0,4%***
	Test			

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Classe d'antihypertenseurs – 2012

Analyse selon l'âge - Sans associations fixes

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Age 35-44 ans cC	45-54 ans dD	55-64 ans eE	65-74 ans fF	75 ans et plus gG
Base		**1054**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**Eff**	**1054**	**48**	**167**	**271**	**281**	**287**
	%v	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***
	Test						
Bêtabloquants	Eff	382	25	67	100	100	90
	%v	*36,2%*	*52,6%*	*40,1%*	*36,9%*	*35,4%*	*31,3%*
	Test		Gzfe				
IEC	Eff	234	8	35	64	57	69
	%v	*22,2%*	*16,8%*	*21,3%*	*23,6%*	*20,3%*	*24,1%*
	Test						
Inhibiteur calcique	Eff	292	7	27	68	90	100
	%v	*27,7%*	*13,5%*	*16,5%*	*25,1%*	*31,9%*	*34,8%*
	Test	DHC			dc	DC	DCez
CENTRAL	Eff	39		2	8	19	10
	%v	*3,7%*		*1,3%*	*2,8%*	*6,6%*	*3,7%*
	Test	hd				De	
Alphabloquant	Eff	27			6	8	14
	%v	*2,6%*			*2,2%*	*2,7%*	*4,7%*
	Test	H					
Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	474	17	71	126	127	133
	%v	*45,0%*	*35,8%*	*42,4%*	*46,4%*	*45,3%*	*46,5%*
	Test						
Diurétiques	Eff	368	4	52	90	111	112
	%v	*34,9%*	*8,9%*	*30,9%*	*33,1%*	*39,3%*	*39,1%*
	Test	Ch		C	C	C	C
IDR	Eff	13	2		3	5	4
	%v	*1,3%*	*3,2%*		*1,1%*	*1,8%*	*1,2%*
	Test						
ANTIALDO	Eff	47		8	9	15	15
	%v	*4,4%*		*5,1%*	*3,3%*	*5,3%*	*5,1%*
	Test	a					

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Age 35-44 ans cC	45-54 ans dD	55-64 ans eE	65-74 ans fF	75 ans et plus gG
Base		**1054**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**Eff**	**38**	**3**		**9**	**8**	**17**
	%v	***3,6%***	***6,5%***		***3,3%***	***3,0%***	***6,1%***
	Test						
ST Spécialités diverses	**Eff**	**12**			**3**	**3**	**6**
	%v	***1,1%***			***1,2%***	***1,1%***	***2,0%***
	Test						
ST GENERIQUES	**Eff**	**306**	**7**	**50**	**77**	**82**	**90**
	%v	***29,0%***	***14,4%***	***30,0%***	***28,5%***	***29,2%***	***31,3%***
	Test	**C**		**c**	**c**	**C**	**C**
dont ST GENERIQUES HTA	**Eff**	**304**	**7**	**50**	**77**	**82**	**88**
	%v	***28,8%***	***14,4%***	***30,0%***	***28,5%***	***29,2%***	***30,6%***
	Test	**C**		**c**	**c**	**C**	**C**
dont Bêtabloquants	Eff	113	5	23	24	29	33
	%v	*10,7%*	*10,1%*	*13,8%*	*8,8%*	*10,2%*	*11,3%*
	Test						
dont IEC	Eff	93		12	35	21	25
	%v	*8,8%*		*7,3%*	*12,8%*	*7,4%*	*8,8%*
	Test				f		
dont Inhibiteur calcique	Eff	66		6	17	19	23
	%v	*6,3%*		*3,7%*	*6,4%*	*6,9%*	*8,1%*
	Test						d
dont CENTRAL	Eff	20			6	9	5
	%v	*1,9%*			*2,1%*	*3,3%*	*1,9%*
	Test	h					
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	14	2		3	6	3
	%v	*1,3%*	*4,3%*		*1,3%*	*2,0%*	*0,9%*
	Test						
dont Diurétiques	Eff	15			5	4	6
	%v	*1,4%*			*1,8%*	*1,5%*	*2,0%*
	Test						
dont ANTIALDO	Eff	31		8	5	8	10
	%v	*3,0%*		*5,1%*	*1,8%*	*2,9%*	*3,3%*
	Test						
dont ST Problèmes cardio vasculaires	**Eff**	**2**					**2**
	%v	***0,2%***					***0,7%***
	Test						

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA (n=1023)

KANTAR HEALTH

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Les médicaments cités– 2012
Avec associations fixes

	TOTAL	
	Eff.	% Vert.
Base	1054	*100,0%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**871**	***82,7%***
Bêtabloquants	344	*32,6%*
IEC	161	*15,3%*
Inhibiteur calcique	226	*21,4%*
CENTRAL	39	*3,7%*
Alphabloquant	27	*2,6%*
Inhibiteur de l'angiotensine II	269	*25,5%*
Diurétiques	120	*11,4%*
IDR	8	*0,8%*
ANTIALDO	47	*4,4%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**38**	***3,6%***
ST Spécialités diverses	**12**	***1,1%***
ST Associations fixes	**321**	***30,4%***
IEC + diurétique	54	*5,1%*
Betabloquant + Autre	3	*0,2%*
Betabloquant + diurétique	30	*2,8%*
Betabloquant + IC	7	*0,6%*
IA II + diurétique	173	*16,4%*
IA II+IC	37	*3,6%*
Diurétique + Autre	5	*0,5%*
IEC + inhibiteur calcique	22	*2,1%*
ST GENERIQUES	**306**	***29,0%***
dont ST GENERIQUES HTA	**303**	***28,8%***
dont Bêtabloquants	113	*10,7%*
dont IEC	91	*8,6%*
dont Inhibiteur calcique	66	*6,3%*
dont CENTRAL	20	*1,9%*
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	14	*1,3%*
dont Diurétiques	13	*1,2%*
dont ANTIALDO	31	*3,0%*
dont ST Problèmes cardio vasculaires	**2**	***0,2%***
dont ST Associations fixes	**2**	***0,2%***
dont IEC + diurétique	2	*0,2%*

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Classe d'antihypertenseurs – 2012 (1/2)

Analyse selon le sexe - Avec associations fixes

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Sexe Homme aA	Sexe Femme bB
Base		1054	514	540
% horizontal		100,0%	48,8%	51,2%
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE HTA	**Eff**	**871**	**417**	**454**
	%v	**82,7%**	**81,2%**	**84,1%**
	Test			
Bêtabloquants	Eff	344	164	180
	%v	32,6%	31,9%	33,3%
	Test			
IEC	Eff	161	98	64
	%v	15,3%	19,0%	11,9%
	Test		B	
Inhibiteur calcique	Eff	226	121	104
	%v	21,4%	23,6%	19,4%
	Test	CDH		
CENTRAL	Eff	39	22	17
	%v	3,7%	4,2%	3,2%
	Test	hd		
Alphabloquant	Eff	27	8	20
	%v	2,6%	1,5%	3,6%
	Test	H		a
Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	269	131	138
	%v	25,5%	25,5%	25,5%
	Test			
Diurétiques	Eff	120	46	74
	%v	11,4%	9,0%	13,7%
	Test	DH		a
IDR	Eff	8	3	5
	%v	0,8%	0,5%	1,0%
	Test			
ANTIALDO	Eff	47	11	36
	%v	4,4%	2,2%	6,6%
	Test	a		A
ST Problèmes cardio vasculaires	**Eff**	**38**	**16**	**22**
	%v	**3,6%**	**3,2%**	**4,0%**
	Test			
ST Spécialités diverses	**Eff**	**12**	**4**	**8**
	%v	**1,1%**	**0,8%**	**1,5%**
	Test			

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Sexe Homme aA	Sexe Femme bB
Base		1054	514	540
% horizontal		100,0%	48,8%	51,2%
ST Associations fixes	**Eff**	**321**	**163**	**158**
	%v	**30,4%**	**31,6%**	**29,3%**
	Test	**C**		
IEC + diurétique	Eff	54	24	30
	%v	5,1%	4,7%	5,5%
	Test			
Betabloquant + Autre	Eff	3	3	
	%v	0,2%	0,5%	
	Test			
Betabloquant + diurétique	Eff	30	10	19
	%v	2,8%	2,0%	3,6%
	Test	g		
Betabloquant + IC	Eff	7	5	2
	%v	0,6%	0,9%	0,4%
	Test			
IA II + diurétique	Eff	173	94	79
	%v	16,4%	18,2%	14,7%
	Test	h		
IA II+IC	Eff	37	21	17
	%v	3,6%	4,0%	3,1%
	Test			
Diurétique + Autre	Eff	5	3	3
	%v	0,5%	0,5%	0,5%
	Test			
IEC + inhibiteur calcique	Eff	22	10	12
	%v	2,1%	2,0%	2,3%
	Test	h		

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	Sexe Homme aA	Sexe Femme bB
Base		1054	514	540
% horizontal		100,0%	48,8%	51,2%
ST GENERIQUES	**Eff**	**306**	**156**	**150**
	%v	**29,0%**	**30,3%**	**27,8%**
	Test	**C**		
dont ST GENERIQUES HTA	**Eff**	**303**	**155**	**148**
	%v	**28,8%**	**30,2%**	**27,4%**
	Test	**C**		
dont Bêtabloquants	Eff	113	60	53
	%v	10,7%	11,6%	9,9%
	Test			
dont IEC	Eff	91	54	37
	%v	8,6%	10,5%	6,9%
	Test		b	
dont Inhibiteur calcique	Eff	66	34	32
	%v	6,3%	6,5%	6,0%
	Test			
dont CENTRAL	Eff	20	11	10
	%v	1,9%	2,1%	1,8%
	Test	h		
dont Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	14	5	9
	%v	1,3%	1,0%	1,6%
	Test			
dont Diurétiques	Eff	13	7	6
	%v	1,2%	1,4%	1,1%
	Test			
dont ANTIALDO	Eff	31	9	22
	%v	3,0%	1,8%	4,1%
	Test			a
vasculaires	**Eff**	**2**		**2**
	%v	**0,2%**		**0,4%**
	Test			
dont ST Associations fixes	**Eff**	**2**	**1**	**1**
	%v	**0,2%**	**0,1%**	**0,2%**
	Test			
dont IEC + diurétique	Eff	2	1	1
	%v	0,2%	0,1%	0,2%
	Test			

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Classe d'antihypertenseurs – 2012 (1/2)

Analyse selon l'âge - Avec associations fixes

99%		TOTAL zZ	Age 35-44 ans cC	45-54 ans dD	55-64 ans eE	65-74 ans fF	75 ans et plus gG
Base		**1054**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
ST MEDICAMENTS POUR L'HYPERTENSION	**Eff**	**871**	**42**	**134**	**228**	**230**	**238**
	%v	***82,7%***	***86,8%***	***80,2%***	***84,2%***	***81,7%***	***82,9%***
	Test						
Bêtabloquants	Eff	344	25	52	91	90	85
	%v	*32,6%*	*52,6%*	*31,3%*	*33,6%*	*31,9%*	*29,8%*
	Test		GZFDe				
IEC	Eff	161	5	28	47	33	48
	%v	*15,3%*	*10,0%*	*16,7%*	*17,4%*	*11,9%*	*16,9%*
	Test						
Inhibiteur calcique	Eff	226	2	21	52	68	83
	%v	*21,4%*	*3,4%*	*12,5%*	*19,2%*	*24,2%*	*29,0%*
	Test	CDH		c	C	CD	CDEz
CENTRAL	Eff	39		2	8	19	10
	%v	*3,7%*		*1,3%*	*2,8%*	*6,6%*	*3,7%*
	Test	hd				De	
Alphabloquant	Eff	27			6	8	14
	%v	*2,6%*			*2,2%*	*2,7%*	*4,7%*
	Test	H					
Inhibiteur de l'angiotensine II	Eff	269	14	43	75	66	71
	%v	*25,5%*	*29,4%*	*26,0%*	*27,6%*	*23,4%*	*24,8%*
	Test						
Diurétiques	Eff	120	3	9	27	34	48
	%v	*11,4%*	*5,9%*	*5,2%*	*9,8%*	*12,0%*	*16,9%*
	Test	DH				D	DCez
IDR	Eff	8	2		1	4	2
	%v	*0,8%*	*3,2%*		*0,4%*	*1,3%*	*0,7%*
	Test						
ANTIALDO	Eff	47		8	9	15	15
	%v	*4,4%*		*5,1%*	*3,3%*	*5,3%*	*5,1%*
	Test	a					

99%		TOTAL zZ	Age 35-44 ans cC	45-54 ans dD	55-64 ans eE	65-74 ans fF	75 ans et plus gG
Base		**1054**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
ST Problèmes cardio vasculaires	**Eff**	**38**	**3**		**9**	**8**	**17**
	%v	***3,6%***	***6,5%***		***3,3%***	***3,0%***	***6,1%***
	Test						
ST Spécialités diverses	**Eff**	**12**			**3**	**3**	**6**
	%v	***1,1%***			***1,2%***	***1,1%***	***2,0%***
	Test						
ST Associations fixes	**Eff**	**321**	**6**	**47**	**78**	**99**	**90**
	%v	***30,4%***	***13,2%***	***28,4%***	***28,9%***	***35,2%***	***31,2%***
	Test	**C**		**c**	**C**	**C**	**C**
IEC + diurétique	Eff	54	1	8	11	20	14
	%v	*5,1%*	*3,1%*	*4,5%*	*4,0%*	*7,0%*	*5,0%*
	Test						
Betabloquant + Autre	Eff	3				1	2
	%v	*0,2%*				*0,3%*	*0,6%*
	Test						
Betabloquant + diurétique	Eff	30		15	7	5	3
	%v	*2,8%*		*8,8%*	*2,5%*	*1,9%*	*1,0%*
	Test	g		GFZE			
Betabloquant + IC	Eff	7			2	4	1
	%v	*0,6%*			*0,8%*	*1,3%*	*0,3%*
	Test						
IA II + diurétique	Eff	173		21	45	53	54
	%v	*16,4%*		*12,4%*	*16,6%*	*18,7%*	*19,0%*
	Test	h					
IA II+IC	Eff	37	3	7	7	11	10
	%v	*3,6%*	*6,4%*	*4,0%*	*2,5%*	*4,0%*	*3,3%*
	Test						
Diurétique + Autre	Eff	5			2	2	2
	%v	*0,5%*			*0,7%*	*0,6%*	*0,6%*
	Test						
IEC + inhibiteur calcique	Eff	22	2		7	6	7
	%v	*2,1%*	*3,8%*		*2,7%*	*2,0%*	*2,6%*
	Test	h					

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA (n=1023)

KANTAR HEALTH

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

Classe d'antihypertenseurs – 2012 (2/2)

Analyse selon l'âge - Avec associations fixes

99%		TOTAL zZ	Age 35-44 ans cC	45-54 ans dD	55-64 ans eE	65-74 ans fF	75 ans et plus gG
Base		**1054**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**
% horizontal		*100,0%*	*4,6%*	*15,8%*	*25,7%*	*26,7%*	*27,2%*
ST GENERIQUES	**Eff**	**306**	**7**	**50**	**77**	**82**	**90**
	%v	***29,0%***	***14,4%***	***30,0%***	***28,5%***	***29,2%***	***31,3%***
	Test	**C**		**c**	**c**	**C**	**C**
dont ST GENERIQUES HTA	**Eff**	**303**	**7**	**50**	**77**	**81**	**88**
	%v	***28,8%***	***14,4%***	***30,0%***	***28,5%***	***29,0%***	***30,6%***
	Test	**C**		**c**	**c**	**c**	**C**
dont Bêtabloquants	Eff	113	5	23	24	29	33
	%v	*10,7%*	*10,1%*	*13,8%*	*8,8%*	*10,2%*	*11,3%*
	Test						
dont IEC	Eff	91		12	35	20	24
	%v	*8,6%*		*7,3%*	*12,8%*	*7,2%*	*8,5%*
	Test				f		
dont Inhibiteur calcique	Eff	66		6	17	19	23
	%v	*6,3%*		*3,7%*	*6,4%*	*6,9%*	*8,1%*
	Test						d
dont CENTRAL	Eff	20			6	9	5
	%v	*1,9%*			*2,1%*	*3,3%*	*1,9%*
	Test	h					
l'angiotensine II	Eff	14	2		3	6	3
	%v	*1,3%*	*4,3%*		*1,3%*	*2,0%*	*0,9%*
	Test						
dont Diurétiques	Eff	13			5	3	5
	%v	*1,2%*			*1,8%*	*1,2%*	*1,6%*
	Test						
dont ANTIALDO	Eff	31		8	5	8	10
	%v	*3,0%*		*5,1%*	*1,8%*	*2,9%*	*3,3%*
	Test						
cardio vasculaires	**Eff**	**2**					**2**
	%v	***0,2%***					***0,7%***
	Test						
fixes	**Eff**	**2**				**1**	**1**
	%v	***0,2%***				***0,3%***	***0,4%***
	Test						
dont IEC + diurétique	Eff	2				1	1
	%v	*0,2%*				*0,3%*	*0,4%*
	Test						

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA (n=1023)

Q2 : A partir de la liste ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle

KANTAR HEALTH

3.1.6 Les génériques

Estimation du nombre de génériques pris – 2012



Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q4 : Actuellement, indiquez le ou les médicament(s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous forme « générique.

Estimation du nombre de génériques pris – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**1054**	**514**	**540**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**	**271**	**783**
% horizontal		*100.0%*	*48.8%*	*51.2%*	*4.6%*	*15.8%*	*25.7%*	*26.7%*	*27.2%*	*25.7%*	*74.3%*
BONNE ESTIMATION	Eff	587	284	304	25	104	157	149	153	162	425
	%v	*55.7%*	*55.2%*	*56.2%*	*52.0%*	*62.3%*	*57.8%*	*52.9%*	*53.3%*	*59.8%*	*54.3%*
	Test										
SUR ESTIMATION	Eff	363	175	188	16	50	89	110	98	92	271
	%v	*34.4%*	*34.1%*	*34.8%*	*34.0%*	*30.3%*	*32.7%*	*38.9%*	*34.2%*	*34.0%*	*34.6%*
	Test										
SOUS ESTIMATION	Eff	75	40	35	5	6	21	18	24	11	64
	%v	*7.1%*	*7.8%*	*6.4%*	*10.5%*	*3.7%*	*7.9%*	*6.4%*	*8.4%*	*3.9%*	*8.2%*
	Test	hd							d		H
NR	Eff	29	15	14	2	6	4	5	12	6	23
	%v	*2.8%*	*3.0%*	*2.6%*	*3.6%*	*3.7%*	*1.6%*	*1.8%*	*4.1%*	*2.3%*	*2.9%*
	Test										

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q4 : Actuellement, indiquez le ou les médicament(s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous forme « générique.

Estimation du nombre de génériques pris – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**1054**	**316**	**299**	**124**	**312**	**3****
% horizontal		*100.0%*	*30.0%*	*28.4%*	*11.8%*	*29.6%*	*0.3%*
BONNE ESTIMATION	Eff	587	187	164	64	171	1
	%v	*55.7%*	*59.0%*	*55.0%*	*51.7%*	*55.0%*	*26.6%*
	Test						
SUR ESTIMATION	Eff	363	103	101	47	109	2
	%v	*34.4%*	*32.4%*	*33.9%*	*38.1%*	*35.1%*	*73.4%*
	Test						
SOUS ESTIMATION	Eff	75	16	29	10	20	
	%v	*7.1%*	*5.2%*	*9.7%*	*7.9%*	*6.3%*	
	Test			a			
NR	Eff	29	11	4	3	11	
	%v	*2.8%*	*3.4%*	*1.4%*	*2.3%*	*3.6%*	
	Test						

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q4 : Actuellement, indiquez le ou les médicament(s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous forme « générique.

Estimation du nombre de génériques pris – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	3 pathologies: Total Ll
Base		**1054**	**1054**	**518**	**518**	**409**	**354**	**55***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*100.0%*	*49.2%*	*49.2%*	*38.8%*	*33.6%*	*5.2%*	*12.1%*
BONNE ESTIMATION	Eff	587	587	294	294	224	192	32	69
	%v	*55.7%*	*55.7%*	*56.8%*	*56.8%*	*54.7%*	*54.2%*	*58.1%*	*54.3%*
	Test								
SUR ESTIMATION	Eff	363	363	176	176	140	124	16	47
	%v	*34.4%*	*34.4%*	*33.9%*	*33.9%*	*34.4%*	*35.0%*	*30.2%*	*36.7%*
	Test								
SOUS ESTIMATION	Eff	75	75	29	29	36	30	6	10
	%v	*7.1%*	*7.1%*	*5.6%*	*5.6%*	*8.8%*	*8.6%*	*10.2%*	*7.8%*
	Test								
NR	Eff	29	29	19	19	9	8	1	2
	%v	*2.8%*	*2.8%*	*3.6%*	*3.6%*	*2.1%*	*2.2%*	*1.5%*	*1.3%*
	Test								

Base : Ensemble des individus traités pour HTA (n=1054)

Q4 : Actuellement, indiquez le ou les médicament(s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous forme « générique.

Perception du générique versus les médicaments de marque – 2012



Base : Ensemble des individus qui déclarent prendre des génériques pour l'HTA (n=514)

Q5 : Concernant le ou les médicament (s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous une forme « générique », vous avez constatez ?

Perception du générique versus les médicaments de marque – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Efficacité sur la tension											
Base		**514**	**248**	**267**	**18****	**81***	**131**	**150**	**134**	**131**	**383**
% horizontal		*100.0%*	*48.2%*	*51.8%*	*3.6%*	*15.8%*	*25.5%*	*29.2%*	*26.0%*	*25.5%*	*74.5%*
Jamais de différence	Eff	413	209	205	15	56	114	121	108	100	313
	%v	*80.4%*	*84.2%*	*76.8%*	*82.5%*	*68.3%*	*86.6%*	*80.7%*	*80.9%*	*76.3%*	*81.7%*
	Test	d	b				D	d	d		
Parfois une différence	Eff	46	17	30	2	11	8	13	13	14	32
	%v	*9.0%*	*6.7%*	*11.1%*	*9.6%*	*13.6%*	*6.0%*	*8.6%*	*9.5%*	*10.5%*	*8.5%*
	Test										
Souvent une différence	Eff	19	9	10		4	4	5	5	3	16
	%v	*3.7%*	*3.5%*	*3.8%*		*5.0%*	*3.2%*	*3.5%*	*4.1%*	*2.4%*	*4.1%*
	Test										
Sr	Eff	36	14	22	1	11	5	11	7	14	22
	%v	*7.0%*	*5.6%*	*8.3%*	*8.0%*	*13.0%*	*4.2%*	*7.3%*	*5.5%*	*10.7%*	*5.7%*
	Test					e					
Moy.		0.18	0.15	0.20	0.10	0.27	0.13	0.17	0.19	0.17	0.18
Ect.		0.47	0.45	0.50	0.31	0.56	0.42	0.46	0.49	0.44	0.48
Médiane											
Mini											
Maxi		2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Base de la moyenne		479	234	245	17	71	126	139	126	117	361
Test											

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Effets secondaires											
Base		**514**	**248**	**267**	**18****	**81***	**131**	**150**	**134**	**131**	**383**
% horizontal		*100.0%*	*48.2%*	*51.8%*	*3.6%*	*15.8%*	*25.5%*	*29.2%*	*26.0%*	*25.5%*	*74.5%*
Jamais de différence	Eff	388	188	200	17	60	109	111	90	101	287
	%v	*75.4%*	*75.9%*	*74.9%*	*92.0%*	*74.3%*	*83.3%*	*73.7%*	*67.7%*	*77.0%*	*74.8%*
	Test				Gzfd		Gzf				
Parfois une différence	Eff	37	19	18	1	2	7	11	15	8	29
	%v	*7.2%*	*7.6%*	*6.8%*	*8.0%*	*2.6%*	*5.2%*	*7.6%*	*11.3%*	*5.7%*	*7.7%*
	Test	d							D		
Souvent une différence	Eff	16	8	8		4	1	4	7	3	13
	%v	*3.1%*	*3.1%*	*3.1%*		*5.0%*	*0.7%*	*2.9%*	*4.9%*	*2.3%*	*3.4%*
	Test	e							e		
Sr	Eff	74	33	41		15	14	24	21	20	54
	%v	*14.4%*	*13.4%*	*15.3%*		*18.0%*	*10.8%*	*15.8%*	*16.1%*	*15.0%*	*14.2%*
	Test										
Moy.		0.16	0.16	0.15	0.08	0.16	0.07	0.16	0.25	0.12	0.17
Ect.		0.45	0.45	0.45	0.27	0.50	0.29	0.45	0.55	0.40	0.47
Médiane											
Mini											
Maxi		2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Base de la moyenne		440	215	226	18	67	117	126	112	111	329
Test		e							Ec		

Base : Ensemble des individus qui déclarent prendre des génériques pour l'HTA (n=514)

Q5 : Concernant le ou les médicament (s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous une forme « générique », vous avez constatez ?

Perception du générique versus les médicaments de marque – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		Total	Sexe		Age					Pcs diabète	
			Homme	Femme	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
Efficacité sur la tension											
Base		514	248	267	18**	81*	131	150	134	131	383
% horizontal		100.0%	48.2%	51.8%	3.5%	15.8%	25.5%	29.2%	26.0%	25.5%	74.5%
Jamais de différence	Eff	413	209	206	15	56	114	121	108	100	313
	%col	80.4%	84.2%	77.2%	83.3%	69.1%	87.0%	80.7%	80.6%	76.3%	81.7%
	Test	d	b				D	d	d		
Parfois une différence	Eff	46	17	30	2	11	8	13	13	14	32
	%col	9.0%	6.9%	11.2%	11.1%	13.6%	6.1%	8.7%	9.7%	10.7%	8.4%
	Test										
Souvent une différence	Eff	19	9	10		4	4	5	6	3	16
	%col	3.7%	3.6%	3.7%		4.9%	3.1%	3.3%	4.5%	2.3%	4.2%
	Test										
Sr	Eff	36	14	22	1	11	5	11	7	14	22
	%col	7.0%	5.6%	8.2%	5.6%	13.6%	3.8%	7.3%	5.2%	10.7%	5.7%
	Test					c					
Moy.		0.18	0.15	0.20	0.10	0.27	0.13	0.17	0.19	0.17	0.18
Ect.		0.47	0.45	0.50	0.31	0.56	0.42	0.46	0.49	0.44	0.48
Mediane											
Mini											
Maxi		2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Base de la moyenne		479	234	245	17	71	126	138	126	117	361
Test											

Tests aux seuils 95 et 99%		Total	Sexe		Age					Pcs diabète	
			Homme	Femme	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
Effets secondaires											
Base		514	248	267	18**	81*	131	150	134	131	383
% horizontal		100.0%	48.2%	51.8%	3.5%	15.8%	25.5%	29.2%	26.0%	25.5%	74.5%
Jamais de différence	Eff	388	188	200	17	60	109	111	90	101	287
	%col	75.4%	75.8%	74.9%	93.9%	74.1%	83.2%	73.7%	67.2%	77.1%	74.9%
	Test				Cd d		Cd d				
Parfois une différence	Eff	37	19	18	1	2	7	11	15	8	29
	%col	7.2%	7.6%	6.8%	5.6%	2.5%	5.3%	7.3%	11.2%	6.1%	7.7%
	Test	d							D		
Souvent une différence	Eff	16	8	8		4	1	4	7	3	13
	%col	3.1%	3.2%	3.0%		4.9%	0.8%	2.7%	4.9%	2.3%	3.4%
	Test	c							c		
Sr	Eff	74	33	41		15	14	24	21	19	54
	%col	14.4%	13.3%	15.3%		18.5%	10.8%	16.0%	15.7%	14.5%	14.1%
	Test										
Moy.		0.16	0.16	0.15	0.08	0.16	0.07	0.16	0.25	0.12	0.17
Ect.		0.45	0.45	0.45	0.27	0.50	0.29	0.45	0.55	0.40	0.47
Mediane											
Mini											
Maxi		2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Base de la moyenne		440	215	226	16	67	117	126	112	111	329
Test		c							Ec		

Base : Ensemble des individus qui déclarent prendre des génériques pour l'HTA (n=514)

Q5 : Concernant le ou les médicament (s) pour l'hypertension artérielle qui vous sont délivrés sous une forme « générique », vous avez constatez ?

KANTAR HEALTH

3.1.7 L’observance des traitements

Observance du traitement – 2012



Score moyen d'observance : 0,6 (ET : 0,8)

Score moyen d'observance : 0,6 (ET : 0,8)

Score moyen d'observance : 0,5 (ET : 0,8)

Score moyen d'observance : 0,5 (ET : 0,8)

Score de 0 (bonne observance:
Score de 1 ou 2 (observance minime:
Score de 3 à 6 (mauvaise observance)

Q8 à Q13.

Observance du traitement – 2012

Q8 : De matin, avez-vous oublié de prendre un ou plusieurs de vos médicaments ?



Q9 : Depuis votre dernière consultation chez votre médecin, avez-vous manqué médicaments ?

Observance du traitement – 2012

Q10 : Au cours du dernier mois, vous-est-il arrivé de prendre vos médicaments avec retard par rapport à l'heure habituelle ?





Q11 : Au cours du dernier mois, vous-est-il arrivé de ne pas prendre vos médicaments parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

Base : Ensemble des individus traités pour HTA, cholestérol ou diabète (n=1394)

Observance du traitement – 2012

Q12: Au cours du dernier mois, vous-est-il arrivé de ne pas prendre vos médicaments parce que , certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?





Q13 : Pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre ?

Base : Ensemble des individus traités pour HTA, cholestérol ou diabète (n=1394)

Observance des traitements HTA, Cholestérol ou diabète – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**1394**	**685**	**709**	**71***	**232**	**348**	**388**	**354**	**363**	**1031**
% horizontal		*100.0%*	*49.2%*	*50.8%*	*5.1%*	*16.7%*	*25.0%*	*27.8%*	*25.4%*	*26.0%*	*74.0%*
Bonne observance	Eff	781	369	412	32	105	201	231	212	179	602
	%v	*56.0%*	*53.8%*	*58.2%*	*44.2%*	*45.3%*	*57.7%*	*59.6%*	*59.9%*	*49.3%*	*58.4%*
	Test	Dh					Dc	Dc	Dc		H
Observance minime	Eff	475	247	229	31	87	111	134	112	132	343
	%v	*34.1%*	*36.0%*	*32.3%*	*42.9%*	*37.6%*	*32.0%*	*34.6%*	*31.5%*	*36.5%*	*33.2%*
	Test										
Mauvaise observance	Eff	50	30	21	4	16	17	6	7	23	27
	%v	*3.6%*	*4.4%*	*2.9%*	*6.2%*	*6.9%*	*5.0%*	*1.5%*	*2.0%*	*6.5%*	*2.6%*
	Test	F				FG	Fg			Iz	
Nr	Eff	88	40	47	5	24	19	17	23	28	59
	%v	*6.3%*	*5.9%*	*6.7%*	*6.6%*	*10.2%*	*5.3%*	*4.4%*	*6.6%*	*7.8%*	*5.8%*
	Test					Fe					
Moy.		0.59	0.65	0.52	0.83	0.77	0.61	0.51	0.49	0.76	0.53
Ect.		0.87	0.92	0.81	1.08	0.97	0.93	0.74	0.78	1.03	0.79
Médiane					1.00						
Mini											
Maxi		5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Base de la moyenne		1306	645	661	67	209	330	371	331	335	972
Test		g	B		gf	GFz				IZ	

Base : Ensemble des individus traités pour HTA, cholestérol ou diabète (n=1394)

Q8 à Q13.

Observance du traitement HTA – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 66-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Univers : Traités HTA											
Base		**1054**	**514**	**540**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**	**271**	**783**
% horizontal		*100.0%*	*48.8%*	*51.2%*	*4.6%*	*15.8%*	*25.7%*	*26.7%*	*27.2%*	*25.7%*	*74.3%*
Bonne observance	Eff	573	263	311	16	76	154	164	163	132	441
	%v	*54.4%*	*51.1%*	*57.6%*	*33.6%*	*45.7%*	*57.0%*	*58.2%*	*56.8%*	*48.8%*	*56.3%*
	Test	Cd		a			Cd	CD	Cd		h
Observance minime	Eff	365	191	174	26	58	84	100	96	96	269
	%v	*34.6%*	*37.2%*	*32.2%*	*54.3%*	*35.1%*	*31.1%*	*35.4%*	*33.6%*	*35.4%*	*34.3%*
	Test				EGZfd						
Mauvaise observance	Eff	36	23	13	3	8	14	5	6	16	20
	%v	*3.4%*	*4.5%*	*2.4%*	*5.9%*	*5.0%*	*5.1%*	*1.7%*	*2.1%*	*6.0%*	*2.5%*
	Test						f			i	
Nr	Eff	80	37	42	3	24	19	13	21	26	53
	%v	*7.6%*	*7.3%*	*7.8%*	*6.1%*	*14.3%*	*6.8%*	*4.6%*	*7.4%*	*9.8%*	*6.8%*
	Test					Fezg					
Moy.		0.60	0.70	0.51	1.00	0.69	0.61	0.54	0.54	0.75	0.55
Ect.		0.88	0.94	0.80	1.13	0.92	0.94	0.76	0.83	1.04	0.81
Médiane					1.00						
Mini											
Maxi		5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Base de la moyenne		974	477	497	46	143	252	268	265	244	730
Test		b	B		FGze					lz	

Base : Ensemble des individus traités pour HTA

Q8 à Q13.

Observance du traitement HTA sous forme de générique (réel) – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Univers : Au moins un comprimé générique pris pour l'HTA											
Base		**304**	**156**	**148**	**7****	**50***	**77***	**82***	**88***	**65***	**239**
% horizontal		*100.0%*	*51.3%*	*48.7%*	*2.3%*	*16.4%*	*25.4%*	*27.1%*	*28.8%*	*21.3%*	*78.7%*
Bonne observance	Eff	142	69	73	5	25	35	41	37	31	111
	%v	*46.9%*	*44.6%*	*49.3%*	*72.9%*	*50.0%*	*45.1%*	*49.3%*	*42.3%*	*48.6%*	*46.4%*
	Test										
Observance minime	Eff	125	64	61	2	15	31	35	42	23	103
	%v	*41.2%*	*41.3%*	*41.0%*	*27.1%*	*30.0%*	*40.2%*	*43.1%*	*47.7%*	*34.8%*	*42.9%*
	Test								d		
Mauvaise observance	Eff	15	9	6		2	7	2	4	5	10
	%v	*5.0%*	*6.1%*	*3.9%*		*4.1%*	*8.8%*	*2.9%*	*4.5%*	*7.6%*	*4.3%*
	Test										
Nr	Eff	21	13	9		8	4	4	5	6	15
	%v	*6.9%*	*8.0%*	*5.8%*		*15.9%*	*5.8%*	*4.6%*	*5.5%*	*9.0%*	*6.4%*
	Test					f					
Moy.		0.77	0.86	0.68	0.27	0.67	0.86	0.69	0.86	0.85	0.75
Ect.		0.97	1.03	0.90	0.44	1.02	1.08	0.83	0.98	1.14	0.92
Mediane			1.00				1.00		1.00		1.00
Mini											
Maxi		5.00	5.00	5.00	1.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Base de la moyenne		283	143	139	7	42	73	78	83	59	224
Test		C					C	c	C		

Base : Ensemble des individus qui prennent des générique pour HTA

Q8 à Q13.

Observance du traitement HTA sous forme de générique (déclaratif) – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Univers : Au moins un traitement anti-hypertenseur sous forme générique											
Base		**514**	**248**	**267**	**18****	**81***	**131**	**150**	**134**	**131**	**383**
% horizontal		*100.0%*	*48.2%*	*51.8%*	*3.6%*	*15.8%*	*25.5%*	*29.2%*	*26.0%*	*25.5%*	*74.5%*
Bonne observance	Eff	261	116	145	4	36	70	82	69	56	205
	%v	*50.7%*	*46.7%*	*54.5%*	*24.2%*	*43.9%*	*53.0%*	*54.6%*	*51.9%*	*42.5%*	*53.5%*
	Test	C					C	C	c		h
Observance minime	Eff	196	104	92	14	26	46	58	53	53	143
	%v	*38.1%*	*42.0%*	*34.5%*	*75.8%*	*31.6%*	*34.8%*	*38.8%*	*39.3%*	*40.3%*	*37.4%*
	Test				DEZFG						
Mauvaise observance	Eff	19	12	7		4	7	4	4	7	12
	%v	*3.6%*	*4.9%*	*2.5%*		*5.2%*	*5.1%*	*2.6%*	*3.0%*	*5.3%*	*3.1%*
	Test										
Nr	Eff	39	16	23		16	9	6	8	16	23
	%v	*7.5%*	*6.4%*	*8.5%*		*19.3%*	*7.0%*	*4.1%*	*5.8%*	*11.9%*	*6.0%*
	Test					FGZe					
Moy.		0.67	0.79	0.55	1.01	0.69	0.69	0.62	0.65	0.83	0.62
Ect.		0.90	0.96	0.82	0.71	0.96	0.99	0.82	0.88	1.02	0.85
Médiane			1.00		1.00					1.00	
Mini											
Maxi		5.00	5.00	5.00	2.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Base de la moyenne		476	232	244	18	66	122	144	126	115	360
Test			B		fzg					i	

Base : Ensemble des individus qui déclarent prendre des générique pour HTA

Q8 à Q13.

Observance du traitement pour le cholestérol – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Univers : Prise d'un traitement contre le cholestérol											
Base		**774**	**387**	**387**	**28****	**96***	**200**	**254**	**197**	**153**	**622**
% horizontal		*100.0%*	*50.0%*	*50.0%*	*3.6%*	*12.4%*	*25.8%*	*32.8%*	*25.4%*	*19.7%*	*80.3%*
Bonne observance	Eff	433	204	228	14	33	118	141	127	69	363
	%v	*55.9%*	*52.8%*	*59.0%*	*50.4%*	*34.6%*	*59.1%*	*55.4%*	*64.4%*	*45.4%*	*58.5%*
	Test	Dh					D	D	Dz		H
Observance minime	Eff	292	158	134	10	53	71	104	55	71	221
	%v	*37.8%*	*41.0%*	*34.6%*	*37.6%*	*55.0%*	*35.3%*	*40.8%*	*28.0%*	*46.5%*	*35.6%*
	Test	G				GEZf		G		iz	
Mauvaise observance	Eff	32	16	16	2	10	11	3	6	11	22
	%v	*4.2%*	*4.2%*	*4.1%*	*5.7%*	*10.4%*	*5.6%*	*1.3%*	*3.1%*	*6.9%*	*3.5%*
	Test	F				Fg	f				
Nr	Eff	17	8	9	2			6	9	2	15
	%v	*2.2%*	*2.0%*	*2.3%*	*6.3%*			*2.5%*	*4.5%*	*1.1%*	*2.4%*
	Test										
Moy.		0.62	0.69	0.56	0.64	1.04	0.62	0.58	0.46	0.84	0.57
Ect.		0.88	0.92	0.84	0.84	1.01	0.93	0.76	0.84	0.99	0.84
Médiane						1.00				1.00	
Mini											
Maxi		5.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Base de la moyenne		757	379	378	26	96	200	248	188	151	606
Test		g	b			GFZEc				Iz	

Base : Ensemble des individus traités pour le cholestérol

Q8 à Q13.

Observance du traitement pour le diabète – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 66-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Univers : Prise d'un traitement contre le diabète											
Base		**271**	**161**	**110**	**13****	**44***	**73***	**82***	**58***	**71***	**201**
% horizontal		*100.0%*	*59.5%*	*40.5%*	*4.8%*	*16.4%*	*26.9%*	*30.3%*	*21.5%*	*26.1%*	*73.9%*
Bonne observance	Eff	127	72	54	8	18	29	40	31	32	94
	%v	*46.6%*	*44.7%*	*49.6%*	*63.9%*	*40.9%*	*40.2%*	*48.7%*	*52.3%*	*45.4%*	*47.1%*
	Test										
Observance minime	Eff	122	76	46	3	20	37	37	25	33	89
	%v	*45.1%*	*47.2%*	*42.0%*	*22.7%*	*45.7%*	*50.5%*	*45.4%*	*42.6%*	*46.9%*	*44.5%*
	Test						c				
Mauvaise observance	Eff	15	9	6		6	6	3		4	11
	%v	*5.6%*	*5.7%*	*5.4%*		*13.4%*	*7.9%*	*4.1%*		*5.2%*	*5.7%*
	Test										
Nr	Eff	7	4	3	2		1	2	3	2	6
	%v	*2.7%*	*2.4%*	*3.1%*	*13.4%*		*1.5%*	*1.8%*	*5.1%*	*2.5%*	*2.8%*
	Test										
Moy.		0.79	0.85	0.69	0.32	1.10	0.90	0.78	0.52	0.81	0.78
Ect.		0.94	0.98	0.86	0.58	1.23	0.93	0.90	0.62	0.96	0.93
Médiane		1.00	1.00			1.00	1.00	1.00		1.00	1.00
Mini											
Maxi		4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00
Base de la moyenne		264	158	106	11	44	72	81	55	69	195
Test		Gc				CG	CG	cg			

Base : Ensemble des individus traités pour le diabète

Q8 à Q13.

KANTAR HEALTH

3.2 Les comorbidités

KANTAR HEALTH

3.2.1 Cholestérol et diabète

Prise d'un médicament pour le cholestérol – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Prise d'un médicament pour le cholestérol – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Prise d'un médicament pour le cholestérol – 2012

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Oui	Eff	774	387	387	28	96	200	254	197	153	622
	%v	*22.4%*	*22.8%*	*21.9%*	*3.2%*	*10.9%*	*30.3%*	*44.9%*	*39.6%*	*8.8%*	*35.9%*
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZE		HZ
Non	Eff	2665	1295	1370	831	778	457	309	290	1571	1095
	%v	*77.0%*	*76.3%*	*77.6%*	*96.3%*	*88.8%*	*69.2%*	*54.7%*	*58.4%*	*90.8%*	*63.2%*
	Test	IFGE			ZFGED	FGEZ	FG			IZ	
Nr	Eff	23	15	8	4	3	4	2	10	7	16
	%v	*0.7%*	*0.9%*	*0.4%*	*0.5%*	*0.3%*	*0.6%*	*0.4%*	*2.0%*	*0.4%*	*0.9%*
	Test								dfcze		

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Prise d'un médicament pour le cholestérol – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**3462**	**1619**	**853**	**346**	**612**	**32***
% horizontal		*100.0%*	*46.8%*	*24.6%*	*10.0%*	*17.7%*	*0.9%*
Oui	Eff	774	265	220	104	183	2
	%v	*22.4%*	*16.4%*	*25.8%*	*29.9%*	*29.9%*	*6.2%*
	Test	A		Az	AZ	AZ	
Non	Eff	2665	1347	631	240	427	20
	%v	*77.0%*	*83.2%*	*74.0%*	*69.4%*	*69.8%*	*62.7%*
	Test	DC	DZCB				
Nr	Eff	23	7	2	2	2	10
	%v	*0.7%*	*0.4%*	*0.2%*	*0.7%*	*0.3%*	*31.1%*
	Test	b					

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?

Prise d'un médicament pour le diabète – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Prise d'un médicament pour le diabète – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus

Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Prise d'un médicament pour le diabète – 2012

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Oui	Eff	271	161	110	13	44	73	82	58	71	201
	%v	*7.8%*	*9.5%*	*6.2%*	*1.5%*	*5.1%*	*11.0%*	*14.6%*	*11.8%*	*4.1%*	*11.6%*
	Test	CHDb	Bz			C	CDz	CDZ	CDZ		HZ
Non	Eff	3164	1517	1647	847	830	582	479	427	1653	1512
	%v	*91.4%*	*89.4%*	*93.3%*	*98.2%*	*94.6%*	*88.0%*	*84.8%*	*86.0%*	*95.5%*	*87.3%*
	Test	IFGea		Az	ZFEGD	FGEZ				IZ	
Nr	Eff	26	18	8	2	3	6	4	11	7	20
	%v	*0.8%*	*1.1%*	*0.5%*	*0.2%*	*0.3%*	*1.0%*	*0.7%*	*2.3%*	*0.4%*	*1.1%*
	Test	c	b						CDzf		h

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Prise d'un médicament pour le diabète – Rappel 2010

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

	TOTAL	Sexe		Age					PCS Individu	
		Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**3718**	**1822**	**1896**	**915**	**937**	**713**	**613**	**540**	**1845**	**1873**
% horizontal	*100,0%*	*49,0%*	*51,0%*	*24,6%*	*25,2%*	*19,2%*	*16,5%*	*14,5%*	*49,6%*	*50,4%*
Oui	*7,6%*	*8,8%*	*6,5%*	*1,4%*	*4,8%*	*9,7%*	*13,1%*	*14,3%*	*3,5%*	*11,7%*
	AB	b			A	AB	ABZ	ABZc		AZ
Non	*91,0%*	*90,3%*	*91,8%*	*97,8%*	*94,2%*	*88,2%*	*85,6%*	*83,8%*	*95,5%*	*86,7%*
	EDc			ZEDCB	EDCZ	e			BZ	
Non précisé	*1,3%*	*1,0%*	*1,7%*	*0,8%*	*1,0%*	*2,1%*	*1,3%*	*1,9%*	*1,1%*	*1,6%*
			a			a				

Base : Ensemble des individus

Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Prise d'un médicament pour le diabète – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**3462**	**1619**	**853**	**346**	**612**	**32***
% horizontal		*100.0%*	*46.8%*	*24.6%*	*10.0%*	*17.7%*	*0.9%*
Oui	Eff	271	61	74	25	109	2
	%v	*7.8%*	*3.7%*	*8.7%*	*7.3%*	*17.9%*	*5.9%*
	Test	A		A	a	AZCB	
Non	Eff	3164	1551	774	320	499	20
	%v	*91.4%*	*95.8%*	*90.7%*	*92.4%*	*81.7%*	*63.0%*
	Test	D	DZBc	D	D		
Nr	Eff	26	7	6	1	3	10
	%v	*0.8%*	*0.4%*	*0.6%*	*0.3%*	*0.5%*	*31.1%*
	Test						

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

Prise d'un médicament pour le diabète – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		BMI Répondant				
	Total	Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**3718**	**1703**	**886**	**418**	**680**	**31***
% horizontal	*100,0%*	*45,8%*	*23,8%*	*11,2%*	*18,3%*	*0,8%*
Oui	*7,6%*	*3,8%*	*7,0%*	*11,2%*	*16,0%*	*7,4%*
	A		A	Abz	AZBc	
Non	*91,0%*	*95,2%*	*91,6%*	*87,9%*	*83,1%*	*63,5%*
	DE	DZCEB	DEc	Ed	e	
Non précisé	*1,3%*	*1,0%*	*1,4%*	*0,9%*	*0,9%*	*29,0%*
						CDAZB

Base : Ensemble des individus

Q5: Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – 2012

	Total n = 3462 %	Individus traités n = 1054 A %	Individus non traités n = x2388 B %
• **Individus sains**	**60**	**-**	**86**
• **Au moins une pathologie**	**40B**	**100 B**	**14**
– 1 seule pathologie	24B	49B	12
◆ *Hypertension*	*15*	*49*	*-*
◆ *Dyslipidémie*	*7*	*-*	*10*
◆ *Diabète*	*1*	*-*	*2*
– 2 pathologies	13B	39BZ	-
◆ *Hypertension et dyslipidémie*	*10*	*34Z*	*-*
◆ *Hypertension et diabète*	*2*	*5*	*-*
◆ *Dyslipidémie et diabète*	*1*	*-*	*2*
– 3 pathologies	4	12Z	-

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – Rappel 2010

	Total n = 3718 %	Individus traités n = 1169 A %	Individus non traités n = 2549 B %
• **Individus sains**	**58**	**-**	**85**
• **Au moins une pathologie**	**42**	**100**	**15**
– 1 seule pathologie	24	47	13
◆ *Hypertension*	*15*	*47*	*-*
◆ *Dyslipidémie*	*8*	*-*	*11*
◆ *Diabète*	*1*	*-*	*2*
– 2 pathologies	14	41	1
◆ *Hypertension et dyslipidémie*	*11*	*36*	*-*
◆ *Hypertension et diabète*	*2*	*5*	*-*
◆ *Dyslipidémie et diabète*	*1*	*-*	*1*
– 3 pathologies	4	12	-

Base : Ensemble des individus

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – 2012

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Individu sain	Eff	2068	1012	1057	791	645	313	178	142	1367	701
	%v	*59.7%*	*59.6%*	*59.9%*	*91.7%*	*73.5%*	*47.3%*	*31.4%*	*28.6%*	*79.0%*	*40.5%*
	Test	GFIE			GFZED	GFEZ	GF			IZ	
ST Au moins une pathologie	Eff	1394	685	709	71	232	348	388	354	363	1031
	%v	*40.3%*	*40.4%*	*40.1%*	*8.3%*	*26.5%*	*52.7%*	*68.6%*	*71.4%*	*21.0%*	*59.5%*
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZE		HZ
Individu présentant 1 seule pathologie	***Eff***	***816***	***380***	***435***	***55***	***179***	***184***	***203***	***195***	***255***	***561***
	%v	***23.6%***	***22.4%***	***24.7%***	***6.4%***	***20.4%***	***27.8%***	***35.8%***	***39.4%***	***14.7%***	***32.4%***
	Test	***CHd***				***C***	***CDz***	***CDZE***	***CDZE***		***HZ***
Hypertendu	Eff	518	234	285	36	122	115	111	134	175	343
	%v	*15.0%*	*13.8%*	*16.1%*	*4.2%*	*13.9%*	*17.3%*	*19.7%*	*27.0%*	*10.1%*	*19.8%*
	Test	CH				C	C	CDZ	CZDEF		HZ
Dyslipidémique	Eff	251	118	132	13	44	60	78	56	57	194
	%v	*7.2%*	*7.0%*	*7.5%*	*1.5%*	*5.1%*	*9.0%*	*13.8%*	*11.3%*	*3.3%*	*11.2%*
	Test	CHd				C	CD	CDZE	CDZ		HZ
Diabétique	Eff	47	29	19	6	13	10	13	5	23	24
	%v	*1.4%*	*1.7%*	*1.1%*	*0.7%*	*1.5%*	*1.5%*	*2.3%*	*1.1%*	*1.3%*	*1.4%*
	Test							c			
Individu présentant 2 pathologies	***Eff***	***451***	***232***	***218***	***15***	***32***	***133***	***141***	***130***	***85***	***366***
	%v	***13.0%***	***13.7%***	***12.4%***	***1.7%***	***3.7%***	***20.2%***	***24.9%***	***26.2%***	***4.9%***	***21.1%***
	Test	***CDH***				***c***	***CDZ***	***CDZe***	***CDZe***		***HZ***
Hypertendu et dyslipidémique	Eff	354	172	182	9	22	101	116	106	60	294
	%v	*10.2%*	*10.1%*	*10.3%*	*1.1%*	*2.5%*	*15.3%*	*20.6%*	*21.3%*	*3.5%*	*17.0%*
	Test	CDH				c	CDZ	CDZe	CDZE		HZ
Hypertendu et diabétique	Eff	55	36	18	1	2	24	9	18	13	42
	%v	*1.6%*	*2.1%*	*1.0%*	*0.2%*	*0.2%*	*3.6%*	*1.6%*	*3.7%*	*0.7%*	*2.4%*
	Test	CDH	B				CDZf	Cd	CDzf		Hz
Dyslipidémique et Diabétique	Eff	42	24	18	4	9	8	15	6	12	30
	%v	*1.2%*	*1.4%*	*1.0%*	*0.5%*	*1.0%*	*1.2%*	*2.7%*	*1.2%*	*0.7%*	*1.7%*
	Test	C						Cdz			H
Individu présentant 3 pathologies	***Eff***	***127***	***73***	***55***	***2***	***21***	***31***	***45***	***29***	***23***	***104***
	%v	***3.7%***	***4.3%***	***3.1%***	***0.2%***	***2.4%***	***4.7%***	***7.9%***	***5.8%***	***1.3%***	***6.0%***
	Test	***CHd***				***C***	***Cd***	***CDZe***	***CD***		***HZ***

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7: Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – Rappel 2010

Analyse selon le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%	TOTAL	Sexe		Age					PCS Individu	
		Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**3718**	**1822**	**1896**	**915**	**937**	**713**	**613**	**540**	**1845**	**1873**
% horizontal	*100,0%*	*49,0%*	*51,0%*	*24,6%*	*25,2%*	*19,2%*	*16,5%*	*14,5%*	*49,6%*	*50,4%*
Individu sain	***58,4%***	***57,6%***	***59,3%***	***90,6%***	***72,1%***	***44,5%***	***32,8%***	***27,9%***	***77,5%***	***39,6%***
	EDC			**EDZCB**	**EDCZ**	**ED**			**BZ**	
ST Au moins une pathologie	***41,6%***	***42,4%***	***40,7%***	***9,4%***	***27,9%***	***55,5%***	***67,2%***	***72,1%***	***22,5%***	***60,4%***
	AB				**A**	**ABZ**	**ABZC**	**ABZC**		**AZ**
Individu présentant 1 seule pathologie	***24,0%***	***22,8%***	***25,1%***	***7,3%***	***19,4%***	***33,4%***	***32,3%***	***38,3%***	***15,4%***	***32,4%***
	AB				***A***	***ABZ***	***ABZ***	***ABZd***		***AZ***
Hypertendu	*14,8%*	*12,9%*	*16,7%*	*4,3%*	*11,6%*	*21,2%*	*18,4%*	*25,7%*	*9,9%*	*19,7%*
	AB		A		A	ABZ	ABz	ABZD		AZ
Dyslipidémique	*7,9%*	*8,5%*	*7,3%*	*2,4%*	*7,0%*	*10,4%*	*12,9%*	*9,8%*	*5,0%*	*10,8%*
	A				A	Abz	ABZ	A		AZ
Diabétique	*1,3%*	*1,5%*	*1,1%*	*0,6%*	*0,8%*	*1,9%*	*1,0%*	*2,8%*	*0,6%*	*2,0%*
	a					a		Abdz		A
Individu présentant 2 pathologies	***13,9%***	***15,1%***	***12,7%***	***2,1%***	***6,1%***	***17,5%***	***28,3%***	***26,1%***	***5,5%***	***22,1%***
	AB	***b***			***A***	***ABz***	***ABZC***	***ABZC***		***AZ***
Hypertendu et dyslipidémique	*11,2%*	*12,3%*	*10,2%*	*1,3%*	*4,5%*	*14,3%*	*22,8%*	*22,3%*	*4,2%*	*18,2%*
	AB	b			A	ABz	ABZC	ABZC		AZ
Hypertendu et diabétique	*1,7%*	*1,6%*	*1,8%*	*0,2%*	*1,2%*	*2,0%*	*3,0%*	*3,3%*	*0,7%*	*2,7%*
	A				a	A	Ab	Ab		Az
Dyslipidémique et Diabétique	*0,9%*	*1,2%*	*0,7%*	*0,6%*	*0,4%*	*1,2%*	*2,4%*	*0,6%*	*0,6%*	*1,2%*
	b						BAEz			
Individu présentant 3 pathologies	***3,7%***	***4,5%***	***2,9%***		***2,4%***	***4,6%***	***6,7%***	***7,7%***	***1,5%***	***5,8%***
	b	***B***				***b***	***BZ***	***BZc***		***AZ***

Base : Ensemble des individus

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5: Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**3462**	**1619**	**853**	**346**	**612**	**32***
% horizontal		*100.0%*	*46.8%*	*24.6%*	*10.0%*	*17.7%*	*0.9%*
Individu sain	**Eff**	**2068**	**1152**	**470**	**175**	**243**	**28**
	%v	***59.7%***	***71.2%***	***55.0%***	***50.4%***	***39.8%***	***86.8%***
	Test	**DCb**	**DZBC**	**D**	**D**		
ST Au moins une pathologie	**Eff**	**1394**	**466**	**384**	**172**	**368**	**4**
	%v	***40.3%***	***28.8%***	***45.0%***	***49.6%***	***60.2%***	***13.2%***
	Test	**A**		**Az**	**AZ**	**AZBC**	
Individu présentant 1 seule pathologie	***Eff***	***816***	***309***	***212***	***104***	***189***	***2***
	%v	***23.6%***	***19.1%***	***24.8%***	***30.0%***	***30.9%***	***7.3%***
	Test	***A***		***A***	***Az***	***AZb***	
Hypertendu	Eff	518	176	133	62	145	1
	%v	*15.0%*	*10.9%*	*15.6%*	*18.0%*	*23.8%*	*4.3%*
	Test	A		A	A	AZBc	
Dyslipidémique	Eff	251	120	62	38	30	1
	%v	*7.2%*	*7.4%*	*7.2%*	*10.9%*	*4.9%*	*3.0%*
	Test	d	d		Dz		
Diabétique	Eff	47	13	17	4	13	
	%v	*1.4%*	*0.8%*	*2.0%*	*1.1%*	*2.2%*	
	Test			a		a	
Individu présentant 2 pathologies	***Eff***	***451***	***139***	***134***	***54***	***123***	***1***
	%v	***13.0%***	***8.6%***	***15.7%***	***15.7%***	***20.0%***	***2.7%***
	Test	***A***		***Az***	***A***	***AZb***	
Hypertendu et dyslipidémique	Eff	354	110	115	46	83	
	%v	*10.2%*	*6.8%*	*13.4%*	*13.3%*	*13.6%*	
	Test	A		Az	A	Az	
Hypertendu et diabétique	Eff	55	12	13	2	26	1
	%v	*1.6%*	*0.7%*	*1.6%*	*0.6%*	*4.3%*	*2.7%*
	Test	Ac				ACZB	
Dyslipidémique et Diabétique	Eff	42	17	6	6	13	
	%v	*1.2%*	*1.1%*	*0.7%*	*1.8%*	*2.1%*	
	Test					b	
Individu présentant 3 pathologies	***Eff***	***127***	***18***	***38***	***14***	***57***	***1***
	%v	***3.7%***	***1.1%***	***4.4%***	***3.9%***	***9.3%***	***3.2%***
	Test	***A***		***A***	***a***	***AZBC***	

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total	BMI Répondant				
		Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**3718**	**1703**	**886**	**418**	**680**	**31***
% horizontal	*100,0%*	*45,8%*	*23,8%*	*11,2%*	*18,3%*	*0,8%*
Individu sain	***58,4%***	***71,6%***	***53,1%***	***45,4%***	***40,4%***	***58,7%***
	DCB	**DCZB**	**DC**			**d**
ST Au moins une pathologie	***41,6%***	***28,4%***	***46,9%***	***54,6%***	***59,6%***	***41,3%***
	A		**AZ**	**AZB**	**AZBe**	
Individu présentant 1 seule pathologie	***24,0%***	***19,1%***	***27,4%***	***26,4%***	***30,4%***	***23,5%***
	A		***Az***	***A***	***AZ***	
Hypertendu	*14,8%*	*11,5%*	*15,7%*	*15,1%*	*21,5%*	*18,0%*
	A		A		AZBC	
Dyslipidémique	*7,9%*	*6,7%*	*10,1%*	*10,5%*	*6,5%*	*5,5%*
			Adz	ad		
Diabétique	*1,3%*	*0,8%*	*1,6%*	*0,8%*	*2,3%*	
					ac	
Individu présentant 2 pathologies	***13,9%***	***7,7%***	***16,7%***	***22,3%***	***20,4%***	***15,7%***
	A		***Az***	***AZb***	***AZ***	
Hypertendu et dyslipidémique	*11,2%*	*6,4%*	*14,2%*	*17,8%*	*15,6%*	*10,4%*
	A		Az	AZ	AZ	
Hypertendu et diabétique	*1,7%*	*0,8%*	*1,7%*	*2,2%*	*3,8%*	*2,2%*
	A				AZb	
Dyslipidémique et Diabétique	*0,9%*	*0,6%*	*0,8%*	*2,3%*	*1,1%*	*3,1%*
				a		
Individu présentant 3 pathologies	***3,7%***	***1,6%***	***2,8%***	***5,9%***	***8,8%***	***2,1%***
	A			***Ab***	***ABZe***	

Base : Ensemble des individus

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3718)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités chez les moins de 60 ans – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de moins de 60 ans (n=xxxx)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités chez les moins de 60 ans – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus âgés de moins de 60 ans (n=2116)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités chez les 60 ans et plus – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 60 ans et plus (n=xxxx)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q6: Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q7 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

HTA et comorbidités chez les 60 ans et plus – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus âgés de 60 ans et plus (n=1602)

Q1 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter l'hypertension artérielle?
Q3 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le cholestérol?
Q5 : Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le diabète?

KANTAR HEALTH

3.3 Santé et mode de vie

BMI – 2012



BMI moyen chez les individus traités (ET)	**28,0 5,3)**
BMI moyen chez les individus non traités (ET)	**25,2 (4,5)**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q20 : Quel est votre taille?

Q21 : Quel est votre poids?

BMI – Rappel 2010



BMI moyen chez les individus traités (ET)	**28.0 (5.4)**
BMI moyen chez les individus non traités (ET)	**25.3 (4.5)**

Base : Ensemble des individus

Q11 : Quel est votre taille?
Q12 : Quel est votre poids?

Répartition du BMI en effectif – 2012 vs 2010



BMI moyen (ET) 2012	**26,0 (4,9)**
BMI moyen (ET) 2010	**26.2 (4.9)**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q20 : Quel est votre taille?

Q21 : Quel est votre poids?

BMI – 2012

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total hommes n=1697	Hommes traités n=514 A	Hommes non traités n=1173 B	Total femmes n=1765	Femmes traitées n=540 A	Femmes non traitées n=1215 B
• BMI moyen.....	26,3	28,0	25,6	25,8	28.0B	24,8
• Ecart-type	4,2	4,5	3,8	5,5	6.0	4,0
• Médiane	25,8	27,2	25,1	24,7	26,8	23,8
• Min / Max	17 / 50	17 / 47	17 / 50	13 / 55	16 / 55	13 / 54
• Sous total BMI ≥ 30.....	16%	28% B	11%	19%	32% B	14%

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q20 : Quel est votre taille?

Q21: Quel est votre poids?

BMI – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total hommes n=1822	Hommes traités n=570 A	Hommes non traités n=1252 B	Total femmes n=1896	Femmes traitées n=594 A	Femmes non traitées n=1297 B
• BMI moyen.....	26,5	27.9 B	25,8	25,9	28,2 B	24,9
• Ecart-type	4,1	4,3	3,8	5,6	6,2	5.0
• Médiane	25,9	27,5	25,3	24,9	27,1	23,8
• Min / Max	16.4/56.7	19.8/49.5	16.4/56.7	11.8/57.5	16.0/57.5	11.8/52.4
• Sous total BMI ≥ 30.....	17%	27% B	13%	19%	30% B	14%

Base : Ensemble des individus

Q11 : Quel est votre taille?

Q12 : Quel est votre poids?

BMI – 2012

Analyse selon le traitement et l'âge

	Total 35-44 ans n=862	35-44 ans traités n=48 A	35-44 ans non traités n=812 B	Total 45-54 ans n=877	45-54 ans traités n=167 A	45-54 ans non traités n=709 B
• BMI moyen	25,4	31.2	25.0	25.8	28.8	25,1
• Ecart-type.....	4,9	5,8	4,5	5,3	6.3	4,8
• Médiane	24,5	30.0	24,2	24.9	27.7	25.3
• Min / Max.....	16 / 50	20 / 50	16 / 46	16 / 54	18 / 49	16 / 54
• Sous total BMI ≥ 30 ...	15%	49%ZB	13%	17%	35%ZB	13%

	Total 55-64 ans n=661	55-64 ans traités n=271 A	55-64 ans non traités n=386 B	Total 65-74 ans n=566	65 -74 ans traités n=281 A	65 -74 ans non traités n=282 B
• BMI moyen.....	26,9	28.8	25,6	26,5	27.4	25,7
• Ecart-type	5.2	5.1	4,8	4,5	4.8	4.0
• Médiane.....	26,1	28.0	24.8	26.0	26,7	25.3
• Min / Max	16 / 50	18 / 48	16 / 50	16 / 55	18 / 55	16 / 40
• Sous total BMI ≥ 30...	23%	36%ZB	15%	18%	24%zB	12%

	Total 75 ans et plus n=470	75 ans et plus traités n=287 A	75 ans et plus non traités n=199 B
• BMI moyen	25.9	26,8	24.7
• Ecart-type	4,2	4,3	3,7
• Médiane.....	25.6	26,3	24,3
• Min / Max.....	13 / 43	16 / 43	13 / 37
• Sous total BMI ≥ 30 ...	16%	23%B	6%

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q20 : Quel est votre taille?

Q21 : Quel est votre poids?

BMI – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et l'âge

	Total 35-44 ans n=915	35-44 ans traités n=54 A	35-44 ans non traités n=862 B
• BMI moyen	25.5	30.4 B	25.2
• Ecart-type	5.2	7.3	4,9
• Médiane	24,3	30.8	24,2
• Min / Max	11.8/56.7	18.3/51.0	11.8/56.7
• Sous total BMI ≥ 30	16%	51% B	14%

	Total 45-54 ans n=937	45-54 ans traités n=182 A	45-54 ans non traités n=752 B
• BMI moyen	26,1	29.0 B	25,4
• Ecart-type	5,1	6.7	4,4
• Médiane	25,1	28.5	24,6
• Min / Max	16.2/57.5	17.1/57.5	16.2/47.0
• Sous total BMI ≥ 30	20%	39% B	15%

	Total 55-64 ans n=713	55-64 ans traités n=300 A	55-64 ans non traités n=413 B
• BMI moyen	26.7	28.5 B	25,3
• Ecart-type	4.9	5,4	4,0
• Médiane	25,9	27.7	24.9
• Min / Max	15.6/54.1	17.6/54.1	15.6/45.2
• Sous total BMI ≥ 30	20%	31% B	11%

	Total 65-74 ans n=613	65 -74 ans traités n=312 A	65 -74 ans non traités n=301 B
• BMI moyen	26,8	28,0 B	25,6
• Ecart-type	4,6	4,7	4.1
• Médiane	26,4	27,4	25,4
• Min / Max	15.1/ 49.5	17.3/49.5	15.1/41.1
• Sous total BMI ≥ 30	20%	28% B	13%

	Total 75 ans et plus n=540	75 ans et plus traités n=318 A	75 ans et plus non traités n=222 B
• BMI moyen	26,2	26,7 B	25,4
• Ecart-type	4,2	4,1	4,2
• Médiane	25,6	26,3	24.8
• Min / Max	15.9/43.6	16.0/39.1	15.9/43.6
• Sous total BMI ≥ 30	14%	18% B	9%

Base : Ensemble des individus

Q11 : Quel est votre taille?

Q12 : Quel est votre poids?

Tour de taille – 2012

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total n = 3462	Traités n = 1054	Non traités n=2388	Hommes n=1697	Femmes n=1765
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• 49 cm ou moins	1	1	1	2B	1
• 50 à 59 cm	1	<1	1	1	1
• 60 à 69 cm	3A	1	4A	1	5 A
• 70 à 79 cm	10A	4	12AZ	3	16AZ
• 80 à 88 cm	18A	14	20A	16	21Az
• 89 à 93 cm	13	12	14	14	12
• 94 à 102 cm	19	23BZ	18	24BZ	15
• 103 à 110 cm	10b	15BZ	9	14BZ	7
• 111 à 129 cm	8B	10 B	5	9	7
• 130 cm et plus.....	1	2Bz	1	2B	1
• Non précisé.....	16	13	16	15	16

• Moyenne (ET)	92.6 (16.5)	97.6 (16.3) B	90.3 (16.0)	96.2 (16.2)	89.3 (16.1)
• Médiane	92.0	97.0	90.0	96.0	88.0
• Min/max	38 / 193	38 / 190	38 / 193	38 / 193	38 / 192

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q22 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Tour de taille – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total n = 3718	Traités n = 1169	Non traités n=2549	Hommes n=1822	Femmes n=1896
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• 50 à 59 cm	1	<1	1	1	<1
• 60 à 69 cm	2	<1	3 A	<1	5 A
• 70 à 79 cm	9	5	11 A	3	16 A
• 80 à 88 cm	19	12	23 A	17	22 A
• 89 à 93 cm	13	10	14 A	15 B	11
• 94 à 102 cm.....	20	24 B	18	25 B	15
• 103 à 110 cm.....	13	19 B	10	16 B	9
• 111 à 129 cm.....	7	12 B	5	8 B	6
• 130 cm et plus	2	4 B	1	2	2
• Non précisé	14	13	15	13	15
• Moyenne (ET)	93.8 (14.9)	100.0 (15.5)	90.9 (13.6)	97.1 (13.2) B	90.5 (15.7)
• Médiane	93.0	99.0 B	90.0	96.0	89.0
• Min/max	50.0/187.0	50.0/187.0	50.0/170.0	50.0/187.0	52.0/170.0

Base : Ensemble des individus

Q13 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Obésité abdominale – 2012

Analyse selon le traitement et le sexe

Obésité abdominale ATP

Définition : Femme >88 cm – Homme >102 cm

	Total n = 3462	Traités n=1054	Non traités n=2388	Hommes n=1697	Femmes n=1765
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence	33B	49BZ	27	25	42AZ
• Absence	51A	39	57AZ	60BZ	43
• Non précisé	16a	13	16A	15	16

Obésité abdominale IDF

Définition : Femme >80 cm – Homme >94 cm

	Total n = 3462	Traités n=1054	Non traités n=2388	Hommes n=1697	Femmes n=1765
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence	52B	68BZ	45	46	57AZ
• Absence	32A	19	38AZ	39BZ	26
• Non précisé	16a	13	16A	15	16

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q22 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Obésité abdominale – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et le sexe

Obésité abdominale ATP

Définition : Femme >88 cm – Homme >102 cm

	Total n = 3718	Traités n=1169	Non traités n=2549	Hommes n=1822	Femmes n=1896
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence.....	35	51 B	28	27	43 A
• Absence.....	51	36	58 A	60 B	42
• Non précisé.....	14	13	14	13	15

Obésité abdominale IDF

Définition : Femme >80 cm – Homme >94 cm

	Total n = 3718	Traités n=1169	Non traités n=2549	Hommes n=1822	Femmes n=1896
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence.....	55	70 B	48	49	61 A
• Absence.....	31	17	37 A	38 B	24
• Non précisé.....	14	13	15	13	15 a

Base : Ensemble des individus

Q13 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Obésité abdominale – 2012

Analyse selon le sexe et le traitement

Obésité abdominale ATP

Définition : Femme >88 cm – Homme >102 cm

	Total n = 3462	Traités hommes n=514	Traités femmes n=540	Non traités hommes n=1173	Non traités femmes n=1215
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence	33	38	59A	20	34A
• Absence	51	50B	28	64B	50
• Non précisé	16	12	13	16	16

Obésité abdominale IDF

Définition : Femme >80 cm – Homme >94 cm

	Total n = 3462	Traités hommes n=514	Traités femmes n=524	Non traités hommes n=1173	Non traités femmes n=1215
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence	52	61	75	40	51A
• Absence.....	32	27B	12	44B	33
• Non précisé	16	12	13	16	16

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q22 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Obésité abdominale – Rappel 2010

Analyse selon le sexe et le traitement

Obésité abdominale ATP

Définition : Femme >88 cm – Homme >102 cm

	Total n = 3718	Traités hommes n=570	Traités femmes n=1896	Non traités hommes n=1252	Non traités femmes n=1297
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence.....	35	42	60 A	19	36 A
• Absence.....	51	48 B	25	66 B	50
• Non précisé.....	14	10	15 A	15	14

Obésité abdominale IDF

Définition : Femme >80 cm – Homme >94 cm

	Total n = 3718	Traités hommes n=570	Traités femmes n=1896	Non traités hommes n=1252	Non traités femmes n=1297
		A	B	A	B
	%	%	%	%	%
• Présence.....	55	68	71	40	56 A
• Absence.....	31	22 B	14	45 B	29
• Non précisé.....	14	10	15 A	15	15

Base : Ensemble des individus

Q13 : Quel est votre tour de taille (mesurez avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

Tabagisme actuel – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q23 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme actuel – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus

Q14 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme actuel – 2012
Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**3462**	**1619**	**853**	**346**	**612**	**32***
% horizontal		*100.0%*	*46.8%*	*24.6%*	*10.0%*	*17.7%*	*0.9%*
Oui	Eff	675	358	161	53	101	2
	%v	*19.5%*	*22.1%*	*18.8%*	*15.3%*	*16.5%*	*6.2%*
	Test	c	CDz				
Non	Eff	2774	1259	693	293	511	19
	%v	*80.1%*	*77.8%*	*81.2%*	*84.7%*	*83.5%*	*59.7%*
	Test			a	Az	Az	
NR	Eff	13	2				11
	%v	*0.4%*	*0.1%*				*34.1%*
	Test						

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q23 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme actuel – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total zZ	BMI Répondant Moins de 25 aA	25 à 27.9 bB	28 à 29.9 cC	30 et plus (Obésité) dD	Non précisé eE
Base	**3718**	**1703**	**886**	**418**	**680**	**31***
% horizontal	*100,0%*	*45,8%*	*23,8%*	*11,2%*	*18,3%*	*0,8%*
Oui	*18,9%*	*21,3%* BdE	*15,7%*	*18,4%* e	*17,8%*	*7,9%*
Non	*80,7%* e	*78,6%*	*83,8%* Ae	*81,6%* e	*82,0%* e	*62,7%*
Non précisé	*0,4%*	*0,1%*	*0,4%*		*0,2%*	*29,3%* ABD

Base : Ensemble des individus

Q14 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme actuel – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Oui	Eff	675	478	196	126	71	48	7	59	40	11	8	12
	%v	*19.5%*	*23.1%*	*14.1%*	*15.4%*	*13.8%*	*19.1%*	*14.4%*	*13.1%*	*11.2%*	*20.2%*	*19.7%*	*9.0%*
	Test	BILHED	BIHELDZ		Ii		LIh						
Non	Eff	2774	1579	1196	689	447	202	40	391	313	44	34	116
	%v	*80.1%*	*76.3%*	*85.8%*	*84.4%*	*86.2%*	*80.5%*	*85.6%*	*86.7%*	*88.6%*	*79.8%*	*80.3%*	*91.0%*
	Test	A		AZf	AZ	AZ			AZf	AZF			AZFd
NR	Eff	13	11	2	1		1		1	1			
	%v	*0.4%*	*0.5%*	*0.1%*	*0.1%*		*0.4%*		*0.2%*	*0.2%*			
	Test		bd										

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q23 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme actuel – Rappel 2010

Analyse selon le moustique de risque

	Total	Moustique de risque répondant										
				Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
		Individu sain	**ST Au moins une pathologie**	Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	**3718**	**2173**	**1545**	**892**	**551**	**293**	**48***	**516**	**417**	**64***	**35***	**137**
% horizontal	*100,0%*	***58,4%***	***41,6%***	*24,0%*	*14,8%*	*7,9%*	*1,3%*	*13,9%*	*11,2%*	*1,7%*	*0,9%*	*3,7%*
Oui	*18,9%* BHGCDKf	***22,8%*** **BHGCDKZFE**	***13,4%***	*14,4%*	*14,0%*	*15,8%*	*9,3%*	*12,2%*	*10,7%*	*18,5%*	*18,5%*	*11,4%*
Non	*80,7%* A	***76,6%***	***86,5%*** **AZ**	*85,5%* AZ	*85,8%* AZ	*84,2%* A	*90,7%* Az	*87,6%* AZ	*89,1%* AZ	*81,5%*	*81,5%*	*88,1%* AZ
Non précisé	*0,4%*	***0,6%*** **cb**	***0,2%***	*0,1%*	*0,2%*			*0,2%*	*0,2%*			*0,5%*

Base : Ensemble des individus

Q14 : Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même très occasionnellement ?

Tabagisme au long terme – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q24 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Tabagisme au long terme – Rappel 2010



Base : Ensemble des individus

Q15 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Tabagisme au long terme – 2012

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd	NR
Base		**3462**	**1619**	**853**	**346**	**612**	**32***
% horizontal		*100.0%*	*46.8%*	*24.6%*	*10.0%*	*17.7%*	*0.9%*
Oui	Eff	1561	701	393	169	296	2
	%v	*45.1%*	*43.3%*	*46.1%*	*48.9%*	*48.4%*	*7.1%*
	Test					a	
Non	Eff	1872	906	457	176	315	18
	%v	*54.1%*	*56.0%*	*53.6%*	*50.7%*	*51.6%*	*56.0%*
	Test						
NR	Eff	29	12	3	1	0	12
	%v	*0.8%*	*0.7%*	*0.4%*	*0.4%*	*0.1%*	*36.8%*
	Test	D	D				

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q24 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Tabagisme au long terme – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total	BMI Répondant				
		Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**3718**	**1703**	**886**	**418**	**680**	**31***
% horizontal	*100,0%*	*45,8%*	*23,8%*	*11,2%*	*18,3%*	*0,8%*
Oui	*46,5%*	*43,1%* e	*46,4%* E	*53,0%* AbE	*52,0%* AbE	*24,3%*
Non	*52,3%*	*55,9%* CD	*52,6%* dc	*46,3%*	*46,8%*	*48,0%*
Non précisé	*1,2%*	*1,0%*	*1,0%*	*0,7%*	*1,1%*	*27,7%* ABCD

Base : Ensemble des individus

Q15 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Tabagisme au long terme – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Oui	Eff	1561	932	630	349	218	109	22	215	168	28	19	66
	%v	*45.1%*	*45.0%*	*45.2%*	*42.8%*	*42.1%*	*43.6%*	*45.9%*	*47.8%*	*47.5%*	*51.0%*	*46.1%*	*51.4%*
	Test												
Non	Eff	1872	1113	759	465	299	140	25	232	184	25	23	62
	%v	*54.1%*	*53.8%*	*54.5%*	*57.0%*	*57.7%*	*56.0%*	*54.1%*	*51.5%*	*52.1%*	*46.1%*	*53.9%*	*48.6%*
	Test												
NR	Eff	29	24	5	2	1	1		3	1	2		
	%v	*0.8%*	*1.2%*	*0.4%*	*0.2%*	*0.2%*	*0.4%*		*0.7%*	*0.4%*	*3.0%*		
	Test	Edb	EDB										

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q24 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Tabagisme au long terme – Rappel 2010

Analyse selon le moustique de risque

	Moustique de risque répondant											
	Total	**Individu sain**	**ST Au moins une pathologie**	Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
				Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	**3718**	**2173**	**1545**	**892**	**551**	**293**	**48***	**516**	**417**	**64***	**35***	**137**
% horizontal	*100,0%*	***58,4%***	***41,6%***	*24,0%*	*14,8%*	*7,9%*	*1,3%*	*13,9%*	*11,2%*	*1,7%*	*0,9%*	*3,7%*
Oui	*46,5%*	***46,0%***	***47,1%***	*44,5%*	*44,4%*	*44,1%*	*47,5%*	*49,5%*	*49,2%*	*49,6%*	*53,6%*	*55,0%* cdeaz
Non	*52,3%*	***52,7%***	***51,8%***	*54,5%* k	*53,9%* k	*55,9%* k	*52,5%*	*49,1%*	*49,5%*	*47,6%*	*46,4%*	*44,4%*
Non précisé	*1,2%*	***1,3%***	***1,1%***	*1,0%*	*1,7%*			*1,4%*	*1,3%*	*2,8%*		*0,6%*

Base : Ensemble des individus

Q15 : Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

Problèmes de santé rencontrés* – 2012

	Total n = 3462 %
A souffert d'au moins un des problèmes de santé suivants.....	**68**
Musculaire osseux articulaire	43
Psychologiques	20
Affection respiratoire	16
Traumatisme	15
Problèmes de vue importants	12
Pathologies cardiovasculaires	11
Cancer	7
Problèmes digestifs	1
Système Nerveux Central	1
Rénaux, urinaires	1
Aucun de ces problèmes de santé rencontré	**32**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

** L'exhaustivité des problèmes de santé cités est présentée en annexe de ce rapport*

Q25 : Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

Problèmes de santé rencontrés* – Rappel 2010

	Total n = 3718 %
A souffert d'au moins un des problèmes de santé suivants	**70**
Affection articulaire ou osseuse	42
Anxiété, dépression nerveuse	20
Traumatisme de type fracture	15
Affection respiratoire	15
Pathologies cardiovasculaires	12
Problèmes de vue important	11
Cancer	7
Migraines	<1
Aucun de ces problèmes de santé rencontré	**29**
Non précisé	**1**

** L'exhaustivité des problèmes de santé cités est présentée en annexe de ce rapport*

Base : Ensemble des individus

Q16 : Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

Problèmes de santé rencontrés* – 2012 (1/2)

Analyse selon le traitement et l'âge

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL zZ	35-44 ans traités HTA aA	45-54 ans traités HTA bB	55-64 ans traités HTA cC	65-74 ans traités HTA dD	75 ans et plus traités HTA eE	35-44 ans non traités HTA fF	45-54 ans non traités HTA gG	55-64 ans non traités HTA hH	65-74 ans non traités HTA iI	75 ans et plus non traités HTA jJ
Base		**3462**	**48***	**167**	**271**	**281**	**287**	**812**	**709**	**386**	**282**	**199**
% horizontal		*100,0%*	*1,4%*	*4,8%*	*7,8%*	*8,1%*	*8,3%*	*23,4%*	*20,5%*	*11,2%*	*8,1%*	*5,7%*
ST Au moins un problème de santé	**Eff**	**2360**	**33**	**119**	**195**	**236**	**268**	**421**	**429**	**276**	**217**	**162**
	%v	***68,2%***	***68,7%***	***71,3%***	***71,9%***	***83,9%***	***93,4%***	***51,8%***	***60,5%***	***71,3%***	***77,0%***	***81,6%***
	Test	**FG**	**f**	**FG**	**FG**	**FGZHCBai**	**FZGHCBIJAD**		**F**	**FG**	**FGZ**	**FGZHcb**
Pathologies cardiovascualires	**Eff**	**374**	**7**	**22**	**46**	**59**	**105**	**19**	**29**	**30**	**24**	**33**
	%v	***10,8%***	***13,4%***	***13,0%***	***17,1%***	***21,1%***	***36,7%***	***2,3%***	***4,1%***	***7,7%***	***8,5%***	***16,7%***
	Test	**FGh**	**f**	**FG**	**FGHIZ**	**FGHIZb**	**FGHZIBCJDA**		**f**	**Fg**	**Fg**	**FGHIz**
Infarctus cardiaque, angine de poitrine, angor	Eff	132	2	11	22	24	39		4	8	7	16
	%v	*3,8%*	*3,7%*	*6,5%*	*8,3%*	*8,5%*	*13,4%*		*0,6%*	*2,0%*	*2,3%*	*8,0%*
	Test	Gh		Ghi	GHIZ	GHIZ	GHIZAbc					GHIz
Dilatation des arteres (par ballonet) ou pontage des arteres du cour	Eff	82	2	4	19	15	28		3	3	5	3
	%v	*2,4%*	*3,7%*	*2,4%*	*6,9%*	*5,5%*	*9,7%*		*0,4%*	*0,8%*	*1,7%*	*1,7%*
	Test	GH			GHIJZb	GHijz	GHIZJB					
Insuffisance cardiaque	Eff	96	3	4	10	12	39	3	2	7	3	12
	%v	*2,8%*	*6,4%*	*2,5%*	*3,9%*	*4,2%*	*13,7%*	*0,3%*	*0,3%*	*1,9%*	*1,1%*	*5,9%*
	Test	GFi			GFi	GFi	GFIHZBCDJ			gf		GFIh
Accident cerebral (paralysie transitoire ou permanente)	Eff	55		4	4	10	12	7	9	4	3	1
	%v	*1,6%*		*2,5%*	*1,6%*	*3,6%*	*4,2%*	*0,8%*	*1,3%*	*0,9%*	*1,2%*	*0,5%*
	Test					jfh	JFhgiz					
Arterite des membres inférieurs ou dilatation des artères ou pontage des artères des jambes	Eff	42		4	8	7	11			5	2	5
	%v	*1,2%*		*2,5%*	*3,0%*	*2,6%*	*3,8%*			*1,2%*	*0,7%*	*2,3%*
	Test				i		izh					
Arythmie cardiaque, port d'un pace maker	Eff	85		2	6	13	36	2	3	6	6	12
	%v	*2,4%*		*1,2%*	*2,1%*	*4,5%*	*12,6%*	*0,2%*	*0,4%*	*1,5%*	*2,0%*	*6,2%*
	Test	FG			f	FGbh	FGHBZICDj			f	f	FGBhizc

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

** L'exhaustivité des problèmes de santé cités est présentée en annexe de ce rapport*

KANTAR HEALTH

Q25 : Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

Problèmes de santé rencontrés* – 2012 (2/2)

Analyse selon le traitement et l'âge

Traumatisme	**Eff**	**515**	**7**	**17**	**40**	**35**	**36**	**121**	**128**	**67**	**46**	**19**
	%v	***14,9%***	***14,1%***	***10,0%***	***14,7%***	***12,5%***	***12,4%***	***14,9%***	***18,1%***	***17,3%***	***16,3%***	***9,3%***
	Test	**Jb**						**j**	**JBedz**	**Jb**	**j**	
Musculaire / Articulaire / Osseux	**Eff**	**1498**	**15**	**72**	**134**	**166**	**213**	**199**	**239**	**180**	**155**	**123**
	%v	***43,3%***	***30,7%***	***43,2%***	***49,5%***	***59,0%***	***74,3%***	***24,5%***	***33,7%***	***46,7%***	***54,9%***	***61,8%***
	Test	**FG**		**Fg**	**FGAz**	**FGZABHc**	**FGZHBCAIDJ**		**F**	**FGa**	**FGZAbh**	**FGZABHC**
Respiratoire	**Eff**	**556**	**16**	**30**	**54**	**66**	**64**	**107**	**100**	**53**	**42**	**23**
	%v	***16,0%***	***32,0%***	***18,3%***	***20,0%***	***23,4%***	***22,3%***	***13,2%***	***14,1%***	***13,6%***	***15,0%***	***11,5%***
	Test	**fj**	**JFHGiz**		**jfgh**	**FJGHZi**	**FJGHzi**					
Psy	**Eff**	**722**	**13**	**52**	**62**	**66**	**55**	**161**	**155**	**92**	**41**	**24**
	%v	***20,9%***	***26,8%***	***31,0%***	***22,7%***	***23,3%***	***19,2%***	***19,8%***	***21,9%***	***23,9%***	***14,5%***	***12,3%***
	Test	**JI**	**j**	**JIFZEg**	**Ji**	**JI**	**j**	**Ji**	**JI**	**JI**		
Cancer	**Eff**	**238**		**4**	**22**	**37**	**43**	**13**	**29**	**27**	**32**	**32**
	%v	***6,9%***		***2,2%***	***8,1%***	***13,0%***	***15,0%***	***1,6%***	***4,0%***	***7,0%***	***11,5%***	***16,2%***
	Test	**FBG**			**FBg**	**FBGZh**	**FBGZHC**		**F**	**FBg**	**FBGz**	**FBGZHC**
Gastro	**Eff**	**35**			**3**	**3**	**3**	**10**	**5**	**6**	**3**	**2**
	%v	***1,0%***			***1,2%***	***1,0%***	***1,2%***	***1,2%***	***0,6%***	***1,4%***	***1,1%***	***1,0%***
	Test											
Problème de vue	**Eff**	**409**	**5**	**10**	**28**	**60**	**105**	**11**	**31**	**31**	**48**	**79**
	%v	***11,8%***	***10,3%***	***6,1%***	***10,2%***	***21,5%***	***36,6%***	***1,4%***	***4,4%***	***8,0%***	***16,9%***	***39,6%***
	Test	**FGBH**	**f**	**f**	**FG**	**FGBHZCa**	**FGHBZCIAD**		**F**	**Fg**	**FGBHcz**	**FGBHZCIAD**
Autres	**Eff**	**115**	**5**		**5**	**7**	**6**	**21**	**40**	**16**	**7**	**7**
	%v	***3,3%***	***10,1%***		***1,8%***	***2,5%***	***2,2%***	***2,6%***	***5,7%***	***4,1%***	***2,6%***	***3,4%***
	Test								**CFEzdi**			
Aucun problème de santé	**Eff**	**1102**	**15**	**48**	**76**	**45**	**19**	**391**	**280**	**111**	**65**	**37**
	%v	***31,8%***	***31,3%***	***28,7%***	***28,1%***	***16,1%***	***6,6%***	***48,2%***	***39,5%***	***28,7%***	***23,0%***	***18,4%***
	Test	**EDJI**	**Ed**	**EDj**	**EDj**	**E**		**EDJZIHCBGa**	**EDJIZHCB**	**EDJ**	**Ed**	**E**

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

** L'exhaustivité des problèmes de santé cités est présentée en annexe de ce rapport*

Q25 : Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

Problèmes de santé rencontrés* – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et l'âge

Tests aux seuils 95 et 99%	Traités HTA						NON Traités HTA					
	TOTAL	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	TOTAL	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus
	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK	lL
Base	**1169**	**54***	**185**	**300**	**312**	**318**	**2549**	**862**	**752**	**413**	**301**	**222**
% horizontal	*31,4%*	*1,4%*	*5,0%*	*8,1%*	*8,4%*	*8,6%*	*68,6%*	*23,2%*	*20,2%*	*11,1%*	*8,1%*	*6,0%*
ST a souffert des problèmes de santé suivants	***81,5%***	***70,8%***	***67,1%***	***77,1%***	***87,3%***	***90,3%***	***64,5%***	***53,2%***	***59,8%***	***73,4%***	***80,5%***	***86,1%***
	C			**c**	**CDAb**	**CDAB**	**Hi**		**H**	**HIG**	**HIGj**	**HIGJ**
Infarctus cardiaque, angine de poitrine, angor	*10,2%*	*2,0%*	*6,0%*	*6,5%*	*11,5%*	*16,2%*	*1,4%*		*1,1%*	*3,0%*	*3,3%*	*2,8%*
	Bdc				Bcd	BDCA				i	i	
Dilatation des arteres (par ballonet) ou pontage des arteres du coeur	*7,3%*	*2,0%*	*2,4%*	*5,8%*	*8,8%*	*11,0%*	*0,7%*		*0,4%*	*2,0%*	*1,3%*	*1,6%*
	Cb			c	CB	CBd				i		
Insuffisance cardiaque	*6,1%*	*4,0%*	*2,5%*	*1,7%*	*6,0%*	*13,0%*	*1,1%*	*0,3%*	*0,2%*	*1,9%*	*1,4%*	*5,1%*
	DC				Dc	DCAEB	IH			ih		IHGk
Accident cerebral (paralysie transitoire ou permanente)	*4,1%*	*1,4%*	*5,1%*	*4,7%*	*4,0%*	*3,6%*	*1,3%*	*0,9%*	*1,7%*	*1,0%*	*1,6%*	*1,8%*
Arterite des membres inférieurs ou dilatation des artères ou pontage des artères des jambes	*4,0%*		*3,2%*	*3,8%*	*4,9%*	*4,5%*	*0,3%*	*0,1%*	*0,3%*	*0,6%*	*0,3%*	*1,0%*
Arythmie cardiaque, port d'un pace maker	*4,7%*		*3,3%*	*3,7%*	*4,0%*	*7,9%*	*1,5%*	*0,5%*	*0,6%*	*2,5%*	*2,9%*	*4,4%*
						cdea	Hi			hi	hi	HIg
Affection articulaire ou osseuse (arthrose, rhumatisme, mal de dos)	*52,8%*	*27,7%*	*36,7%*	*45,3%*	*60,9%*	*65,5%*	*37,0%*	*23,4%*	*35,6%*	*45,5%*	*52,1%*	*58,8%*
	CBd			B	CBDA	CBDA	H		H	HIG	HGI	HGIJ
Affection respiratoire (asthme, bronchite chronique, apnee	*20,2%*	*22,2%*	*16,7%*	*16,5%*	*23,5%*	*22,2%*	*12,7%*	*12,0%*	*12,6%*	*14,5%*	*11,4%*	*14,4%*
					d							
Anxiete, depression nerveuse	*22,6%*	*27,8%*	*24,9%*	*27,0%*	*21,5%*	*17,2%*	*19,4%*	*18,2%*	*20,3%*	*23,2%*	*18,0%*	*16,0%*
	f		f	F						lh		
Traumatisme, de type fracture	*15,4%*	*17,2%*	*20,1%*	*14,3%*	*16,0%*	*12,9%*	*15,1%*	*16,1%*	*15,1%*	*13,1%*	*16,1%*	*14,1%*
			f									
Cancer	*10,3%*	*2,2%*	*2,6%*	*10,2%*	*13,6%*	*12,9%*	*5,4%*	*1,4%*	*2,9%*	*9,1%*	*11,8%*	*13,8%*
	CB			CB	CB	CB	HI		h	HIg	HIG	HIG
Problemes de vue important (cataracte, glaucome, cecite)	*18,9%*	*5,8%*	*6,2%*	*12,2%*	*19,5%*	*34,1%*	*7,7%*	*1,8%*	*3,2%*	*7,1%*	*18,5%*	*32,2%*
	CBD			c	CBd	CBDAE	HI			HI	HIGJ	HIGJK
Problemes cardio-vasculaires	*1,5%*	*3,5%*	*1,6%*	*0,7%*	*1,6%*	*1,8%*	*0,6%*	*0,6%*	*0,3%*	*0,8%*	*0,9%*	*1,0%*
Anomalie de la coagulation du sang							*0,1%*	*0,1%*				*0,5%*
N'a pas souffert de problèmes de santé	***17,7%***	***29,2%***	***32,1%***	***21,1%***	***12,7%***	***9,1%***	***34,5%***	***46,4%***	***38,9%***	***25,2%***	***18,4%***	***12,2%***
	Fe	**Fe**	**FEAD**	**FE**			**LKJ**	**LKJGI**	**LKJg**	**Lk**	**l**	
Non précisé	***0,7%***		***0,8%***	***1,8%***		***0,6%***	***1,0%***	***0,4%***	***1,4%***	***1,4%***	***1,1%***	***1,7%***
							h		**h**			
ST PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES	***24,0%***	***8,2%***	***16,9%***	***17,7%***	***27,1%***	***33,9%***	***6,4%***	***3,1%***	***4,7%***	***8,6%***	***11,2%***	***14,0%***
	Bdc			**b**	**BDC**	**BDCA**	**H**			**Hi**	**HIg**	**HIGj**

Base : Ensemble des individus traités pour l'HTA n=1169)

** L'exhaustivité des problèmes de santé cités est présentée en annexe de ce rapport*

KANTAR HEALTH

Q16 : Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

KANTAR HEALTH

3.4 Hypertension et automesure

KANTAR HEALTH

3.4.1 Prise de la dernière mesure

Prise de la dernière mesure – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q14 : Qui a effectué pour la dernière fois une mesure de votre tension artérielle ?

Prise de la dernière mesure – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'age, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
ST Médecin	**Eff**	**3166**	**1552**	**1613**	**799**	**814**	**605**	**505**	**442**	**1607**	**1559**
	%v	***91.4%***	***91.5%***	***91.4%***	***92.7%***	***92.9%***	***91.5%***	***89.4%***	***89.1%***	***92.9%***	***90.0%***
	Test				**gf**	**gf**				**I**	
Un médecin généraliste	Eff	2946	1461	1485	741	767	561	467	411	1508	1438
	%v	*85.1%*	*86.1%*	*84.1%*	*86.0%*	*87.4%*	*84.8%*	*82.5%*	*82.8%*	*87.2%*	*83.1%*
	Test					fg				Iz	
Un médecin spécialiste	Eff	242	102	140	62	51	50	43	37	106	136
	%v	*7.0%*	*6.0%*	*8.0%*	*7.1%*	*5.8%*	*7.6%*	*7.6%*	*7.4%*	*6.2%*	*7.8%*
	Test			a							
ST Autre professionnel de santé	**Eff**	**92**	**37**	**55**	**33**	**26**	**12**	**11**	**10**	**58**	**34**
	%v	***2.6%***	***2.2%***	***3.1%***	***3.8%***	***2.9%***	***1.9%***	***1.9%***	***2.0%***	***3.4%***	***1.9%***
	Test				**ef**					**I**	
Un pharmacien	Eff	11	1	10	2	4	1	3	1	6	5
	%v	*0.3%*	*0.0%*	*0.6%*	*0.2%*	*0.4%*	*0.2%*	*0.5%*	*0.2%*	*0.3%*	*0.3%*
	Test	a		A							
Un infirmier(e)	Eff	81	36	45	31	22	11	8	9	52	29
	%v	*2.3%*	*2.1%*	*2.6%*	*3.6%*	*2.5%*	*1.7%*	*1.4%*	*1.9%*	*3.0%*	*1.7%*
	Test				Fe					I	
Vous-même	**Eff**	**210**	**109**	**101**	**21**	**32**	**50**	**54**	**54**	**56**	**154**
	%v	***6.1%***	***6.4%***	***5.7%***	***2.5%***	***3.6%***	***7.5%***	***9.5%***	***10.8%***	***3.3%***	***8.9%***
	Test	**CHD**					**CD**	**CDZ**	**CDZ**		**HZ**
Nr	Eff	37	19	18	11	8	6	4	7	16	21
	%v	*1.1%*	*1.1%*	*1.0%*	*1.3%*	*0.9%*	*0.9%*	*0.8%*	*1.5%*	*0.9%*	*1.2%*
	Test										

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q14 : Qui a effectué pour la dernière fois une mesure de votre tension artérielle ?

Prise de la dernière mesure – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		3462	2068	1394	816	518	251	47*	451	354	55*	42*	127
% horizontal		100.0%	59.7%	40.3%	23.6%	15.0%	7.2%	1.4%	13.0%	10.2%	1.6%	1.2%	3.7%
ST Medecin	**Eff**	**3166**	**1909**	**1257**	**736**	**460**	**232**	**44**	**404**	**318**	**47**	**39**	**117**
	%v	**91.4%**	**92.3%**	**90.2%**	**90.2%**	**88.9%**	**92.4%**	**93.8%**	**89.6%**	**89.8%**	**86.2%**	**92.8%**	**91.5%**
	Test		**eb**										
Un médecin généraliste	Eff	2946	1772	1175	704	438	226	41	369	289	43	38	101
	%v	85.1%	85.7%	84.3%	86.3%	84.5%	90.3%	86.0%	81.9%	81.6%	78.1%	89.3%	79.2%
	Test				hi		HIBLZeaj						
Un médecin spécialiste	Eff	242	139	103	46	33	9	5	41	34	4	2	16
	%v	7.0%	6.7%	7.4%	5.7%	6.4%	3.5%	10.1%	9.0%	9.6%	8.1%	5.5%	12.3%
	Test	F	f	F					Fd	Fd			Fd
ST Autre professionnel de sante	**Eff**	**92**	**70**	**22**	**10**	**5**	**5**	**1**	**9**	**6**	**1**	**2**	**3**
	%v	**2.6%**	**3.4%**	**1.6%**	**1.2%**	**0.9%**	**1.9%**	**1.7%**	**1.9%**	**1.6%**	**1.4%**	**5.1%**	**2.5%**
	Test	**EDb**	**EDBI**										
Un pharmacien	Eff	11	9	1	1	1			1	1			
	%v	0.3%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%			0.1%	0.2%			
	Test		bd										
Un infirmier(e)	Eff	81	61	20	9	4	5	1	8	5	1	2	3
	%v	2.3%	2.9%	1.5%	1.1%	0.7%	1.9%	1.7%	1.8%	1.5%	1.4%	5.1%	2.5%
	Test	EDb	EDBi										
Vous-meme	**Eff**	**210**	**68**	**142**	**81**	**66**	**13**	**2**	**49**	**41**	**8**		**12**
	%v	**6.1%**	**3.3%**	**10.2%**	**9.9%**	**12.8%**	**5.0%**	**4.5%**	**10.9%**	**11.5%**	**15.2%**		**9.7%**
	Test	**A**		**AZF**	**AZF**	**AZFg**			**AZF**	**AZFg**	**af**		**a**
Nr	Eff	37	32	6	5	1	4		1			1	
	%v	1.1%	1.5%	0.4%	0.6%	0.2%	1.5%		0.2%			2.1%	
	Test	EHB	EHBd										

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q14 : Qui a effectué pour la dernière fois une mesure de votre tension artérielle ?

KANTAR HEALTH

3.4.2 Utilisation d’un appareil d’automesure

Utilisation d'un appareil d'automesure – 2012

	Total n = 3462	Individus traités n = 1054	Individus non traités n = 2388
	%	**A** *%*	**B** *%*
▪ Possède un appareil à son domicile	21B	41B	**12**
◆ Positionnement sur le bras.....	*8B*	*15B*	*5*
◆ Positionnement au poignet.....	*13B*	*26B*	*7*
◆ Non précisé	*<1*	*1*	*<1*
▪ Ne possède d'appareil à son domicile	78A	59	87AZ
▪ Non précisé	1	-	1

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q15 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q16 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – Rappel 2010

	Total n = 3718	Individus traités n = 1169	Individus non traités n = 2549
	%	A %	B %
Possède un appareil à son domicile	**19**	**36**	**11**
Positionnement sur le bras	*7*	*14*	*6*
Positionnement au poignet	*12*	*22*	*4*
Non précisé	*<1*	*<1*	*1*
Ne possède d'appareil à son domicile	**80**	**63**	**88**
Non précisé	**1**	**1**	**1**

Base : Ensemble des individus

Q10 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q12 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – 2012

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total n = 3462	Traités hommes n=540	Traités femmes n=540	Non traités hommes n=1173	Non traités femmes n=1215
		A	B	A	B
		%	%	%	%
• Possède un appareil à son domicile.....	21	41BZ	40Z	12	13
◆ Positionnement sur le bras	8	14	15	5	5
◆ Positionnement au poignet	13	26Z	26	7	8
◆ Non précisé	<1	<1	<1	<1	<1
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	78	59	59	87Z	87Z

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q15 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q16 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et le sexe

	Total n = 3718	Traités hommes n=570	Traités femmes n=599	Non traités hommes n=1252	Non traités femmes n=1297
		A	B	A	B
		%	%	%	%
• Possède un appareil à son domicile.....	19	37 B	36	10	13
◆ Positionnement sur le bras	11	13	14	4	5
◆ Positionnement au poignet	7	23	21	6	7
◆ Non précisé	1	1	1	-	1
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	80	63	64	89 b	86
• Non précisé.....	1	<1	<1	<1	1

Base : Ensemble des individus

Q10 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q12 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – 2012

Analyse selon le traitement et l'âge

	Total 35-44 ans n=862 %	35-44 ans traités n=48 % A	35-44 ans non traités n=812 % B	Total 45-54 ans n=877 %	45-54 ans traités n=167 % A	45-54 ans non traités n=709 % B
• Possède un appareil à son domicile.....	7	27B	6	13	29B	9
◆ Positionnement sur le bras	2	7	2	5	8b	4
◆ Positionnement au poignet	5	20B	4	8	21B	5
◆ Non précisé	-	-	-	-	-	-
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	92	73	94	87	70	91A
• Non précisé.....	1	-	-	-	1	-

	Total 55-64 ans n=661 %	55-64 ans traités n=271 % A	55-64 ans non traités n=386 % B	Total 65-74 ans n=566 %	65 -74 ans traités n=281 % A	65 -74 ans non traités n=282 % B
• Possède un appareil à son domicile.....	26	35B	19	34	47B	21
◆ Positionnement sur le bras	8	11B	6	13	19B	8
◆ Positionnement au poignet	17	24B	13	21	28B	13
◆ Non précisé	1	<1	<1	-	<1	<1
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	74	65	81A	66	53	78A
• Non précisé.....	-	-	-	-	-	1

	Total 75 ans et plus n=496 %	75 ans et plus traités n=318 % A	75 ans et plus non traités n=199 % B
• Possède un appareil à son domicile	39	42 B	27
◆ Positionnement sur le bras	16	13	13
◆ Positionnement au poignet	22	28 B	14
◆ Non précisé	1	-	-
• Ne possède d'appareil à son domicile	60	58	73A
• Non précisé	1	-	2

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q15 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q16 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – Rappel 2010

Analyse selon le traitement et l'âge

	Total 35-44 ans n=915 %	35-44 ans traités n=54 % A	35-44 ans non traités n=862 % B	Total 45-54 ans n=937 %	45-54 ans traités n=185 % A	45-54 ans non traités n=752 % B
• Possède un appareil à son domicile.....	7	31 B	6	12	26 B	9
◆ Positionnement sur le bras	2	12 b	2	4	10 B	3
◆ Positionnement au poignet	5	19 B	4	7	16 B	6
◆ Non précisé	-	-	-	-	-	-
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	92	69	94 A	87	74	91 A
• Non précisé.....	<1	-	<1	<1	-	<1

	Total 55-64 ans n=713 %	55-64 ans traités n=300 % A	55-64 ans non traités n=413 % B	Total 65-74 ans n=613 %	65 -74 ans traités n=312 % A	65 -74 ans non traités n=301 % B
• Possède un appareil à son domicile.....	22	33 B	14	31	41 B	21
◆ Positionnement sur le bras	9	13 B	6	14	18 B	10
◆ Positionnement au poignet	13	19 B	8	17	23 B	11
◆ Non précisé	-	-	-	-	-	-
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	76	66	84 A	68	58	78 A
• Non précisé.....	1	<1	2	<1	<1	<1

	Total 75 ans et plus n=540 %	75 ans et plus traités n=318 % A	75 ans et plus traités n=222 % B
• Possède un appareil à son domicile	35	42 B	24
◆ Positionnement sur le bras	13	13	12
◆ Positionnement au poignet	22	28 B	12
◆ Non précisé	-	-	-
• Ne possède d'appareil à son domicile	64	58	73 A
• Non précisé	<1	-	2

Base : Ensemble des individus

Q10 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q12 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – 2012

Analyse selon l'âge et le sexe

	Total n = 3462	35-44 ans n=862	45-54 ans n=877	55-64 ans n=661	65-74 ans n=566	75 ans et plus n = 496
	%	%	%	%	%	%
		A	B	C	D	E
• Possède un appareil à son domicile.....	21	7	13A	26ABZ	34ABCZ	39 ABCZ
◆ Positionnement sur le bras	8	3	5A	8AB	13 ABCZ	16 ABCZ
◆ Positionnement au poignet	13	5	8A	17ABZ	21ABZ	22ABcZ
◆ Non précisé	<1	-	<1	<1	1	1
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	78	92 BCDEZ	87CDEZ	74DE	66e	60
• Non précisé.....	1	1	-	-	-	1

	Total n = 3462	Hommes n=1697	Femmes n=1765
		%	%
		A	B
• Possède un appareil à son domicile	21	21	21
◆ Positionnement sur le bras	8	8	8
◆ Positionnement au poignet	13	13	13
◆ Non précisé	<1	<1	<1
• Ne possède d'appareil à son domicile	78	79	78
• Non précisé	1	-	-

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q15 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q16 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation d'un appareil d'automesure – Rappel 2010

Analyse selon l'âge et le sexe

	Total n = 3229	35-44 ans n=793	45-54 ans n=812	55-64 ans n=620	65-74 ans n=533	75 ans et plus n = 470
	%	%	%	%	%	%
		A	B	C	D	E
• Possède un appareil à son domicile.....	18	4	11 A	23 Abc	28 Abc	35 ABCd
◆ Positionnement sur le bras	8	2 E	7 dE	11	12	13
◆ Positionnement au poignet	9	2	4	12 b	15 B	21 aB
◆ Non précisé	1	-	<1	<1	1	1
• Ne possède d'appareil à son domicile.....	80	95 BCDE	87 CDE	75 dE	70 E	61
• Non précisé.....	2	<1	2	1	2	4 Abcd

	Total n = 3229	Hommes n=1582	Femmes n=1647
		%	%
		A	B
• Possède un appareil à son domicile	18	19	17
◆ Positionnement sur le bras	8	9	8
◆ Positionnement au poignet	9	10	9
◆ Non précisé	1	<1	<1
• Ne possède d'appareil à son domicile	80	80	80
• Non précisé	2	2	2

Base : Ensemble des individus

Q10 : Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Q12 : Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ?

Fréquence d'utilisation de l'appareil d'automesure – 2012



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q17 : Actuellement, utilisez-vous l'appareil pour mesurer votre tension artérielle ?

Fréquence d'utilisation de l'appareil d'automesure – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**722**	**349**	**373**	**58***	**109**	**171**	**190**	**193**	**176**	**546**
% horizontal		*100.0%*	*48.3%*	*51.7%*	*8.1%*	*15.2%*	*23.6%*	*26.4%*	*26.8%*	*24.4%*	*75.6%*
Tous les jours	Eff	23	13	10	3		9	8	4	3	20
	%v	*3.1%*	*3.8%*	*2.6%*	*4.3%*		*5.0%*	*4.0%*	*2.1%*	*1.4%*	*3.7%*
	Test										
Plusieurs fois par semaine	Eff	56	29	27		7	13	19	18	12	44
	%v	*7.8%*	*8.4%*	*7.2%*		*6.0%*	*7.7%*	*9.8%*	*9.3%*	*6.7%*	*8.1%*
	Test										
Une fois de temps en temps	Eff	342	171	171	26	46	72	94	105	73	268
	%v	*47.3%*	*49.0%*	*45.7%*	*43.9%*	*41.9%*	*42.0%*	*49.2%*	*54.3%*	*41.7%*	*49.1%*
	Test								ed		
Uniquement quand vous ressentez des signes d'hypertension	Eff	85	39	46	5	15	22	20	23	19	66
	%v	*11.8%*	*11.1%*	*12.3%*	*8.5%*	*13.3%*	*12.6%*	*10.8%*	*12.1%*	*10.8%*	*12.0%*
	Test										
Avant une visite chez un médecin	Eff	7	2	5		2	1	1	2	2	4
	%v	*0.9%*	*0.6%*	*1.3%*		*2.3%*	*0.6%*	*0.8%*	*1.0%*	*1.4%*	*0.8%*
	Test										
Pas d'utilisation depuis un long moment	Eff	206	94	111	25	40	54	47	39	67	139
	%v	*28.5%*	*27.1%*	*29.8%*	*43.3%*	*36.5%*	*31.6%*	*24.7%*	*20.4%*	*37.9%*	*25.5%*
	Test	g			Gfz	Gf	g			Iz	
Nr	Eff	4		4			1	2	2		4
	%v	*0.6%*		*1.1%*			*0.5%*	*0.8%*	*0.9%*		*0.8%*
	Test										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q17 : Actuellement, utilisez-vous l'appareil pour mesurer votre tension artérielle ?

Fréquence d'utilisation de l'appareil d'automesure – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		722	223	499	251	191	53*	7**	196	159	25**	12**	52*
% horizontal		100.0%	30.8%	69.2%	34.8%	26.5%	7.3%	1.0%	27.1%	22.0%	3.4%	1.7%	7.2%
Tous les jours	Eff	23	2	21	10	8	1	1	6	6			5
	%v	3.1%	0.8%	4.2%	4.0%	4.0%	1.8%	18.4%	2.8%	3.5%			10.1%
	Test	A		A	a	a							a
Plusieurs fois par semaine	Eff	56	5	51	22	19	2	1	24	14	10		5
	%v	7.8%	2.5%	10.2%	8.6%	9.7%	4.3%	10.1%	12.4%	9.0%	40.3%		9.5%
	Test	A		A	A	A			Al	A	AFZDIEBLHg		
Une fois de temps en temps	Eff	342	97	244	121	91	26	3	95	83	7	5	28
	%v	47.3%	43.8%	48.9%	48.1%	47.7%	50.0%	44.7%	48.5%	52.4%	28.7%	39.1%	54.1%
	Test	J		J	J				J	J			J
Uniquement quand vous ressentez des signes d'hypertension	Eff	85	16	69	34	31	3		29	23	4	2	7
	%v	11.8%	7.0%	13.9%	13.7%	16.5%	5.4%		14.6%	14.4%	14.9%	16.2%	12.5%
	Test	a		Al	al	AF			al	al			
Avant une visite chez un médecin	Eff	7	1	6	5	5			1	1			
	%v	0.9%	0.3%	1.3%	2.1%	2.8%			0.4%	0.6%			
	Test					a							
Pas d'utilisation depuis un long moment	Eff	206	99	107	59	37	20	2	42	32	4	5	6
	%v	28.5%	44.3%	21.4%	23.5%	19.3%	38.5%	26.8%	21.2%	20.2%	16.1%	44.7%	12.1%
	Test	LBEIh	BLEIHDZJ		I		LEIbhjd					I	
Nr	Eff	4	3	1									1
	%v	0.6%	1.5%	0.2%									1.7%
	Test												

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q17 : Actuellement, utilisez-vous l'appareil pour mesurer votre tension artérielle ?

Utilisation de l'appareil d'automesure par l'entourage – 2012



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q18 : Est-ce que d'autres personnes de votre entourage utilisent aussi l'appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Utilisation de l'appareil d'automesure par l'entourage – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'age, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**722**	**349**	**373**	**58***	**109**	**171**	**190**	**193**	**176**	**546**
% horizontal		*100.0%*	*48.3%*	*51.7%*	*8.1%*	*15.2%*	*23.6%*	*26.4%*	*26.8%*	*24.4%*	*75.6%*
Oui	Eff	387	199	188	31	63	103	95	96	99	288
	%v	*53.6%*	*57.2%*	*50.2%*	*52.7%*	*57.4%*	*60.1%*	*49.8%*	*49.8%*	*56.4%*	*52.7%*
	Test						gf				
Non	Eff	329	147	182	28	43	68	95	95	75	254
	%v	*45.6%*	*42.2%*	*48.8%*	*47.3%*	*39.5%*	*39.9%*	*49.8%*	*49.4%*	*42.8%*	*46.5%*
	Test										
Nr	Eff	6	2	4		3		1	2	1	5
	%v	*0.8%*	*0.6%*	*1.0%*		*3.1%*		*0.4%*	*1.0%*	*0.7%*	*0.9%*
	Test										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q18 : Est-ce que d'autres personnes de votre entourage utilisent aussi l'appareil pour mesurer la tension artérielle ?

Utilisation de l'appareil d'automesure par l'entourage – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**722**	**223**	**499**	**251**	**191**	**53***	**7****	**196**	**159**	**25****	**12****	**52***
% horizontal		*100.0%*	*30.8%*	*69.2%*	*34.8%*	*26.5%*	*7.3%*	*1.0%*	*27.1%*	*22.0%*	*3.4%*	*1.7%*	*7.2%*
Oui	Eff	387	139	248	124	81	41	3	107	89	11	8	16
	%v	*53.6%*	*62.4%*	*49.6%*	*49.5%*	*42.1%*	*76.8%*	*44.1%*	*54.8%*	*55.8%*	*43.5%*	*63.8%*	*31.1%*
	Test	LE	LEBDz	L	I		LEBDZHIJa		Le	Le		I	
Non	Eff	329	81	248	124	108	12	4	89	70	14	4	35
	%v	*45.6%*	*36.5%*	*49.7%*	*49.4%*	*56.4%*	*23.2%*	*55.9%*	*45.2%*	*44.2%*	*56.5%*	*36.2%*	*67.5%*
	Test	Fa	f	FA	FA	FAZih			F	F	F		FAZIHBdk
Nr	Eff	6	2	4	3	3							1
	%v	*0.8%*	*1.1%*	*0.7%*	*1.2%*	*1.5%*							*1.4%*
	Test												

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=722)

Q18 : Est-ce que d'autres personnes de votre entourage utilisent aussi l'appareil pour mesurer la tension artérielle ?

KANTAR HEALTH

3.4.3 Hypertension en automesure

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 135-85



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 135-85



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 140-90



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 140-90



Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 135-85 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests 95,99		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
PAS	Moy.	130.74	133.23	128.26	122.56	128.25	128.16	131.40	135.62	127.39	131.78
	Ect	15.4	14.8	15.5	14.6	13.2	14.8	14.6	16.0	14.4	15.5
	N.	578	288	290	43	83	131	158	162	137	441
	Méd.	130.0	131.7	128.3	122.0	129.3	128.3	131.1	135.0	128.3	131.0
	Min	88.5	98.7	88.5	93.0	99.3	92.0	88.5	92.0	93.0	88.5
	Max	185.0	182.3	185.0	160.3	160.7	166.7	171.0	185.0	160.7	185.0
	T-Test	Chb	Bz			c	c	C	CEDZf		H
PAD	Moy.	77.56	78.94	76.21	74.08	80.36	78.45	77.24	76.66	78.77	77.18
	Ect	11.0	10.9	11.0	9.8	10.8	11.0	10.5	11.5	10.8	11.1
	N.	569	283	286	43	83	128	156	159	137	431
	Méd.	76.7	77.3	75.3	74.6	79.4	78.0	76.3	75.3	78.0	76.3
	Min	51.5	56.3	51.5	54.0	61.3	60.0	51.5	51.5	54.0	51.5
	Max	130.0	120.0	130.0	97.0	102.0	120.0	110.0	130.0	102.0	130.0
	T-Test	c	B			Cgzf	c				
FICARD	Moy.	68.21	66.56	69.84	72.52	72.86	68.52	67.67	64.80	72.18	66.94
	Ect	11.5	11.9	10.9	10.3	13.3	10.5	11.1	10.7	12.5	10.9
	N.	561	277	284	43	81	131	154	153	136	425
	Méd.	66.7	65.0	68.3	71.3	70.8	68.5	66.3	63.3	70.7	65.7
	Min	41.0	41.0	45.0	54.3	45.7	41.0	43.3	42.0	41.0	42.0
	Max	106.0	106.0	97.3	95.3	106.0	98.0	103.0	99.7	106.0	103.0
	T-Test	G		Az	GFZe	GFZe	G	g		IZ	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%	TOTAL	Sexe		Age					PCS Individu	
		Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**566**	**273**	**293**	**48***	**90***	**122**	**157**	**149**	**152**	**414**
% horizontal	*100,0%*	*48,2%*	*51,8%*	*8,5%*	*15,9%*	*21,5%*	*27,7%*	*26,4%*	*26,8%*	*73,2%*
Individus non hypertendus	***57,2%*** **a**	***48,8%***	***65,0%*** **Az**	***76,7%*** **DZEbc**	***59,6%***	***60,7%***	***49,4%***	***54,8%***	***62,4%***	***55,3%***
Individus hypertendus	***42,8%*** **b**	***51,2%*** **Bz**	***35,0%***	***23,3%***	***40,4%*** **a**	***39,3%*** **a**	***50,6%*** **A**	***45,2%*** **A**	***37,6%***	***44,7%***
Systolique isolée	*21,0%*	*26,1%* B	*16,3%*	*3,9%*	*7,5%*	*19,6%* AB	*29,2%* ABz	*27,1%* AB	*11,5%*	*24,4%* A
Diastolique isolée	*6,4%*	*6,4%*	*6,3%*	*10,2%*	*14,8%* Edcz	*5,3%*	*5,3%*	*2,0%*	*11,0%* b	*4,7%*

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		569	283	286	43*	83*	128	156	159	137	431
% horizontal		100.0%	49.7%	50.3%	7.6%	14.6%	22.4%	27.4%	27.9%	24.2%	75.8%
Individus non hypertendus	Eff	396	186	211	38	58	93	110	97	101	296
	%v	69.7%	65.6%	73.7%	86.8%	70.1%	73.3%	70.5%	61.1%	73.4%	68.5%
	Test	g		a	GZFde		g				
Individus hypertendus	Eff	172	97	75	6	25	34	46	62	37	136
	%v	30.3%	34.4%	26.3%	13.2%	29.9%	26.7%	29.5%	38.9%	26.6%	31.5%
	Test	C	b			c	c	C	Cez		
Systolique isolée	Eff	87	47	40	3	5	11	28	40	11	76
	%v	15.3%	16.7%	13.9%	6.1%	6.4%	8.9%	17.6%	25.2%	8.1%	17.6%
	Test	DHce						Dce	DECZ		H
Diastolique isolée	Eff	25	10	15	1	8	9	3	3	11	15
	%v	4.4%	3.6%	5.3%	3.4%	10.1%	7.4%	2.0%	1.7%	7.7%	3.4%
	Test	g				gf	gf				

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%	TOTAL	Sexe		Age					PCS Individu	
		Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**566**	**273**	**293**	**48***	**90***	**122**	**157**	**149**	**152**	**414**
% horizontal	*100,0%*	*48,2%*	*51,8%*	*8,5%*	*15,9%*	*21,5%*	*27,7%*	*26,4%*	*26,8%*	*73,2%*
Individus non hypertendus	***70,1%*** **a**	***62,0%***	***77,7%*** **Az**	***85,6%*** **EDZc**	***72,7%***	***72,9%***	***67,2%***	***64,4%***	***73,0%***	***69,1%***
Individus hypertendus	***29,9%*** **b**	***38,0%*** **Bz**	***22,3%***	***14,4%***	***27,3%***	***27,1%*** **a**	***32,8%*** **A**	***35,6%*** **A**	***27,0%***	***30,9%***
Systolique isolée	*16,9%*	*21,4%* B	*12,6%*	*3,9%*	*9,1%*	*14,1%* a	*20,1%* Ab	*24,6%* ABcz	*12,2%*	*18,6%* a
Diastolique isolée	*4,9%*	*5,2%*	*4,7%*	*6,0%*	*12,1%* Edz	*4,7%*	*2,9%*	*2,5%*	*8,0%*	*3,8%*

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 135-85 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd
Base		569	211	157	66*	135
% horizontal		100.0%	37.0%	27.6%	11.6%	23.7%
Individus non hypertendus	Eff	322	141	84	34	63
	%v	56.7%	67.0%	53.4%	52.0%	46.6%
	Test	d	DZBc			
Individus hypertendus	Eff	247	70	73	32	72
	%v	43.3%	33.0%	46.6%	48.0%	53.4%
	Test	A		A	a	Az
Systolique isolée	Eff	117	31	39	14	34
	%v	20.6%	14.8%	24.6%	20.5%	25.2%
	Test	a		a		a
Diastolique isolée	Eff	32	16	5	2	10
	%v	5.7%	7.6%	2.9%	3.2%	7.2%
	Test		b			

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total zZ	BMI Répondant Moins de 25 aA	25 à 27.9 bB	28 à 29.9 cC	30 et plus (Obésité) dD	Non précisé eE
Base	**566**	**207**	**151**	**82***	**125**	**1****
% horizontal	*100,0%*	*36,5%*	*26,7%*	*14,5%*	*22,1%*	*0,2%*
Individus non hypertendus	***57,2%***	***64,7%*** **db**	***53,7%***	***53,5%***	***51,8%***	
Individus hypertendus	***42,8%***	***35,3%***	***46,3%*** **a**	***46,5%***	***48,2%*** **a**	***100,0%*** **ZABDC**
Systolique isolée	*21,0%*	*21,9%*	*20,5%*	*18,2%*	*22,1%*	
Diastolique isolée	*6,4%* a	*3,1%*	*6,7%*	*7,6%*	*10,6%* a	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 140-90 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 26 Aa	26 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd
Base		569	211	157	66*	135
% horizontal		100.0%	37.0%	27.6%	11.6%	23.7%
Individus non hypertendus	Eff	396	171	104	39	82
	%v	69.7%	81.3%	66.5%	58.7%	60.6%
	Test	d	DZCB			
Individus hypertendus	Eff	172	39	53	27	53
	%v	30.3%	18.7%	33.5%	41.3%	39.4%
	Test	A		A	A	Az
Systolique isolée	Eff	87	16	31	14	26
	%v	15.3%	7.6%	19.6%	20.9%	19.4%
	Test	A		A	a	A
Diastolique isolée	Eff	25	9	5	1	10
	%v	4.4%	4.2%	3.4%	1.1%	7.6%
	Test	c				c

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon le BMI

		BMI Répondant				
	Total	Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**566**	**207**	**151**	**82***	**125**	**1****
% horizontal	*100,0%*	*36,5%*	*26,7%*	*14,5%*	*22,1%*	*0,2%*
Individus non hypertendus	***70,1%***	***76,2%*** **C**	***70,9%***	***59,7%***	***66,6%***	
Individus hypertendus	***29,9%***	***23,8%***	***29,1%***	***40,3%*** **A**	***33,4%***	***100,0%*** **ZABDC**
Systolique isolée	*16,9%*	*17,4%*	*13,1%*	*21,1%*	*17,9%*	
Diastolique isolée	*4,9%* a	*2,1%*	*3,5%*	*10,8%* ab	*7,5%* a	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 135-85 – Selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies Total Ll
Base		569	167	402	200	153	41*	5**	162	135	19**	7**	40*
% horizontal		100.0%	29.4%	70.6%	35.1%	27.0%	7.2%	0.9%	28.4%	23.7%	3.4%	1.3%	7.1%
Individus non hyperiendus	Eff	322	121	201	105	81	24	1	78	66	9	3	18
	%v	56.7%	72.6%	50.0%	52.6%	52.6%	57.9%	9.9%	48.4%	49.1%	46.9%	40.4%	44.0%
	Test	Gb	BGHIDZELj	G	G	G	G		G	G	g		g
Individus hyperiendus	Eff	247	46	201	95	73	17	5	83	69	10	4	23
	%v	43.3%	27.4%	50.0%	47.4%	47.4%	42.1%	90.1%	51.6%	50.9%	53.1%	59.6%	56.0%
	Test	A		Az	A	A	AZFDEBHIj		A	A	a		A
Systolique isolee	Eff	117	15	102	44	28	12	3	45	40	4	1	13
	%v	20.6%	9.0%	25.4%	21.9%	18.2%	30.4%	62.7%	28.0%	29.9%	20.4%	14.3%	32.6%
	Test	A		A	A	a	A	aez	Ae	Aez			A
Diastolique isolee	Eff	32	14	18	7	5	1		10	6	2	2	2
	%v	5.7%	8.4%	4.6%	3.3%	3.5%	3.1%		6.3%	4.4%	11.2%	29.3%	3.9%
	Test		d										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon le moustique de risque

		Moustique de risque répondant										
				Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
	Total	**Individu sain**	**ST Au moins une pathologie**	Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	**566**	**171**	**395**	**204**	**156**	**41***	**7****	**156**	**124**	**24****	**8****	**35***
% horizontal	*100,0%*	***30,2%***	***69,8%***	*36,1%*	*27,6%*	*7,3%*	*1,2%*	*27,6%*	*21,9%*	*4,2%*	*1,4%*	*6,2%*
Individus non hypertendus	***57,2%*** **Dc**	***70,5%*** **DCBZHGk**	***51,4%***	***48,4%***	***42,8%***	***71,0%*** **DCBh**	***40,0%***	***55,8%*** **d**	***54,2%***	***62,9%***	***59,3%***	***49,9%***
Individus hypertendus	***42,8%*** **A**	***29,5%***	***48,6%*** **AE**	***51,6%*** **AEz**	***57,2%*** **AEZg**	***29,0%***	***60,0%***	***44,2%*** **A**	***45,8%*** **Ae**	***37,1%***	***40,7%***	***50,1%*** **a**
Systolique isolée	*21,0%* A	***10,9%***	***25,3%*** **A**	*27,9%* A	*31,2%* Azhge	*16,5%*	*18,6%*	*20,2%* a	*18,7%*	*26,9%*	*24,0%*	*33,2%* A
Diastolique isolée	*6,4%*	***4,9%***	***7,0%***	*6,6%*	*5,9%*	*6,0%*	*27,0%*	*6,9%*	*8,7%*			*9,5%*

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – 2012

Seuil 140-90 – Selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une patho logie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies Total Ll
Base		**569**	**167**	**402**	**200**	**153**	**41***	**5***	**162**	**135**	**19***	**7***	**40***
% horizontal		*100.0%*	*29.4%*	*70.6%*	*35.1%*	*27.0%*	*7.2%*	*0.9%*	*28.4%*	*23.7%*	*3.4%*	*1.3%*	*7.1%*
Individus non hypertendus	Eff	396	140	256	128	93	32	3	106	89	11	5	23
	%v	*69.7%*	*83.7%*	*63.8%*	*63.9%*	*60.4%*	*77.4%*	*61.9%*	*65.3%*	*66.3%*	*57.2%*	*69.1%*	*57.3%*
	Test	e	BEDZHILJ				el						
Individus hypertendus	Eff	172	27	145	72	61	9	2	56	45	8	2	17
	%v	*30.3%*	*16.3%*	*36.2%*	*36.1%*	*39.6%*	*22.6%*	*38.1%*	*34.7%*	*33.7%*	*42.8%*	*30.9%*	*42.7%*
	Test	A		A	A	Aiz			A	A	a		Al
Systolique isolee	Eff	87	11	76	36	28	7	1	29	24	5		11
	%v	*15.3%*	*6.7%*	*19.0%*	*18.0%*	*18.3%*	*16.1%*	*25.9%*	*18.1%*	*18.1%*	*24.9%*		*27.7%*
	Test	A		A	A	A			A	A			A
Diastolique isolee	Eff	25	7	18	9	9			8	4	2	1	1
	%v	*4.4%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.7%*	*6.1%*			*4.7%*	*3.2%*	*11.5%*	*14.8%*	*2.2%*
	Test												

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Hypertension en automesure – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon le moustique de risque

		Moustique de risque répondant										
	Total	Individu sain	ST Au moins une pathologie	Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
				Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	**566**	**171**	**395**	**204**	**156**	**41***	**7****	**156**	**124**	**24****	**8****	**35***
% horizontal	*100,0%*	***30,2%***	***69,8%***	*36,1%*	*27,6%*	*7,3%*	*1,2%*	*27,6%*	*21,9%*	*4,2%*	*1,4%*	*6,2%*
Individus non hypertendus	***70,1%*** **d**	***77,6%*** **DCBz**	***66,9%***	***63,9%***	***60,9%***	***76,9%*** **d**	***53,5%***	***71,6%*** **d**	***71,2%***	***70,0%***	***83,3%***	***63,9%***
Individus hypertendus	***29,9%*** **a**	***22,4%***	***33,1%*** **A**	***36,1%*** **A**	***39,1%*** **Azeg**	***23,1%***	***46,5%***	***28,4%***	***28,8%***	***30,0%***	***16,7%***	***36,1%***
Systolique isolée	*16,9%* a	***9,9%***	***19,9%*** **A**	*19,8%* A	*20,1%* A	*16,9%*	*32,9%*	*17,4%* a	*17,5%*	*22,8%*		*31,4%* A
Diastolique isolée	*4,9%*	***5,3%***	***4,7%***	*4,9%*	*5,2%*	*2,1%*	*13,6%*	*5,1%*	*5,3%*		*16,7%*	*2,5%*

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85



* Pression artérielle incomplète

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85



* Pression artérielle incomplète

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90



* Pression artérielle incomplète

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90



* Pression artérielle incomplète

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**569**	**283**	**286**	**43***	**83***	**128**	**156**	**159**	**137**	**431**
% horizontal		*100.0%*	*49.7%*	*50.3%*	*7.6%*	*14.6%*	*22.4%*	*27.4%*	*27.9%*	*24.2%*	*75.8%*
Hypertension traitée controlée	Eff	174	85	89	6	17	43	56	52	31	143
	%v	*30.5%*	*30.0%*	*31.1%*	*13.2%*	*20.9%*	*33.6%*	*35.8%*	*32.7%*	*22.2%*	*33.2%*
	Test	Chd					Cd	Cd	Cd		H
Hypertension traitée non controlée	Eff	174	92	83	6	19	32	57	60	32	142
	%v	*30.6%*	*32.4%*	*28.9%*	*13.6%*	*23.1%*	*24.8%*	*36.7%*	*38.0%*	*23.1%*	*33.0%*
	Test	C						Cde	Cde		h
... Hypertension systolique isolée non controlée	Eff	85	40	46	3	2	14	31	36	7	78
	%v	*15.0%*	*14.0%*	*16.0%*	*6.5%*	*2.2%*	*11.1%*	*19.7%*	*22.6%*	*5.1%*	*18.2%*
	Test	DHc					D	DCe	DCEz		H
... Hypertension diastolique non controlée	Eff	15	9	6		2	5	4	3	4	11
	%v	*2.6%*	*3.0%*	*2.2%*		*3.0%*	*4.3%*	*2.4%*	*2.1%*	*3.1%*	*2.5%*
	Test										
Normotendu	Eff	149	62	87	29	35	33	33	20	59	90
	%v	*26.1%*	*21.8%*	*30.4%*	*66.0%*	*41.5%*	*26.0%*	*21.0%*	*12.3%*	*42.7%*	*20.9%*
	Test	Gi		a	GFZED	GFZe	G	g		IZ	
Hypertendu non traité	Eff	72	45	28	3	12	20	10	27	16	56
	%v	*12.7%*	*15.8%*	*9.7%*	*7.2%*	*14.6%*	*15.6%*	*6.5%*	*17.0%*	*11.9%*	*12.9%*
	Test	f	b				f		Fc		
... Hypertendu systolique non traité	Eff	32	22	9	2	1	5	4	19	5	27
	%v	*5.6%*	*7.9%*	*3.3%*	*4.7%*	*1.7%*	*3.8%*	*2.7%*	*12.2%*	*3.4%*	*6.3%*
	Test	d	b						DFEz		
... Hypertendu diastolique non traité	Eff	17	6	11	1	7	6	2	2	6	12
	%v	*3.1%*	*2.3%*	*3.9%*	*2.5%*	*7.8%*	*4.6%*	*1.4%*	*1.1%*	*4.2%*	*2.7%*
	Test					gf					

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

		Sexe		Age					PCS Individu	
	TOTAL	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**566**	**273**	**293**	**48***	**90***	**122**	**157**	**149**	**152**	**414**
% horizontal	*100,0%*	*48,2%*	*51,8%*	*8,5%*	*15,9%*	*21,5%*	*27,7%*	*26,4%*	*26,8%*	*73,2%*
Hypertension traitée controlée	*29,5%*	*25,5%*	*33,1%*	*18,7%*	*13,7%*	*34,5%*	*31,8%*	*35,9%*	*20,9%*	*32,6%*
			a			Ba	B	Ba		A
Hypertension traitée non controlée	*30,5%*	*37,7%*	*23,9%*	*9,8%*	*29,4%*	*28,7%*	*35,7%*	*34,0%*	*25,3%*	*32,4%*
	b	Bz			A	A	A	A		
... Hypertension systolique isolée non controlée	*15,9%*	*19,3%*	*12,8%*		*7,5%*	*16,5%*	*20,9%*	*20,5%*	*9,1%*	*18,4%*
		b				b	B	B		A
... Hypertension diastolique non controlée	*4,1%*	*5,6%*	*2,8%*	*2,9%*	*12,3%*	*3,2%*	*3,2%*	*1,3%*	*8,0%*	*2,7%*
					Edcza				b	
Normotendu	*27,7%*	*23,3%*	*31,8%*	*58,0%*	*45,9%*	*26,2%*	*17,6%*	*18,9%*	*41,4%*	*22,7%*
			a	DEZC	DEZC				BZ	
Hypertendu non traité	*12,3%*	*13,5%*	*11,1%*	*13,6%*	*11,0%*	*10,7%*	*14,9%*	*11,2%*	*12,3%*	*12,3%*
... Hypertendu systolique non traité	*5,0%*	*6,7%*	*3,5%*	*3,9%*		*3,1%*	*8,3%*	*6,6%*	*2,4%*	*6,0%*
										a
... Hypertendu diastolique non traité	*2,2%*	*0,8%*	*3,6%*	*7,3%*	*2,5%*	*2,1%*	*2,1%*	*0,7%*	*3,0%*	*2,0%*
			a							

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**569**	**283**	**286**	**43***	**83***	**128**	**156**	**159**	**137**	**431**
% horizontal		*100.0%*	*49.7%*	*50.3%*	*7.6%*	*14.6%*	*22.4%*	*27.4%*	*27.9%*	*24.2%*	*75.8%*
Hypertension traitée controlée	Eff	216	107	110	7	19	54	71	65	36	180
	%v	*38.0%*	*37.7%*	*38.3%*	*16.3%*	*23.1%*	*42.2%*	*45.4%*	*41.1%*	*26.3%*	*41.7%*
	Test	CDH					CD	CD	CD		H
Hypertension traitée non controlée	Eff	132	70	62	5	17	21	42	47	26	105
	%v	*23.2%*	*24.7%*	*21.6%*	*10.5%*	*20.9%*	*16.2%*	*27.1%*	*29.5%*	*19.1%*	*24.4%*
	Test	c						Ce	CE		
... Hypertension systolique isolée non controlée	Eff	68	33	35	1	2	9	25	30	6	62
	%v	*12.0%*	*11.8%*	*12.2%*	*3.4%*	*3.0%*	*7.1%*	*16.3%*	*18.8%*	*4.7%*	*14.3%*
	Test	DHC						DCe	DCEz		H
... Hypertension diastolique non controlée	Eff	17	8	9	1	6	4	2	2	9	8
	%v	*2.9%*	*2.7%*	*3.2%*	*3.4%*	*7.8%*	*3.4%*	*1.5%*	*1.2%*	*6.5%*	*1.8%*
	Test					gf				i	
Normotendu	Eff	180	79	101	30	39	40	39	32	65	115
	%v	*31.7%*	*27.9%*	*35.4%*	*70.5%*	*47.0%*	*31.1%*	*25.1%*	*20.0%*	*47.1%*	*26.8%*
	Test	G			GFZED	GFZe	g			IZ	
Hypertendu non traité	Eff	41	27	13	1	8	13	4	15	10	30
	%v	*7.2%*	*9.7%*	*4.7%*	*2.6%*	*9.1%*	*10.5%*	*2.4%*	*9.4%*	*7.5%*	*7.1%*
	Test	F	b				Fc		Fc		
... Hypertendu systolique non traité	Eff	19	14	5	1	3	2	2	10	5	14
	%v	*3.3%*	*4.9%*	*1.7%*	*2.6%*	*3.5%*	*1.8%*	*1.4%*	*6.4%*	*3.3%*	*3.2%*
	Test		b						fe		
... Hypertendu diastolique non traité	Eff	9	2	6		2	5	1	1	2	7
	%v	*1.5%*	*0.9%*	*2.1%*		*2.3%*	*4.0%*	*0.5%*	*0.5%*	*1.2%*	*1.6%*
	Test										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon l'âge, le sexe et l'activité

		Sexe		Age					PCS Individu	
	TOTAL	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
Base	**566**	**273**	**293**	**48***	**90***	**122**	**157**	**149**	**152**	**414**
% horizontal	*100,0%*	*48,2%*	*51,8%*	*8,5%*	*15,9%*	*21,5%*	*27,7%*	*26,4%*	*26,8%*	*73,2%*
Hypertension traitée controlée	*39,4%*	*36,6%*	*42,0%*	*24,0%*	*25,7%*	*44,5%*	*44,7%*	*42,8%*	*29,3%*	*43,0%*
						BA	BA	Ba		A
Hypertension traitée non controlée	*20,6%*	*26,6%*	*15,1%*	*4,5%*	*17,4%*	*18,7%*	*22,8%*	*27,1%*	*17,0%*	*22,0%*
	b	B			A	A	A	A		
... Hypertension systolique isolée non controlée	*12,3%*	*14,8%*	*9,9%*		*7,5%*	*9,7%*	*15,1%*	*18,2%*	*9,2%*	*13,4%*
								bc		
... Hypertension diastolique non controlée	*2,8%*	*3,3%*	*2,3%*	*2,4%*	*5,4%*	*3,5%*	*1,6%*	*1,9%*	*3,6%*	*2,5%*
Normotendu	*30,8%*	*25,4%*	*35,7%*	*61,6%*	*47,0%*	*28,4%*	*22,5%*	*21,7%*	*43,7%*	*26,1%*
			A	EDZC	EDZC				BZ	
Hypertendu non traité	*9,2%*	*11,4%*	*7,2%*	*9,9%*	*9,9%*	*8,5%*	*10,0%*	*8,4%*	*10,1%*	*8,9%*
... Hypertendu systolique non traité	*4,6%*	*6,6%*	*2,8%*	*3,9%*	*1,6%*	*4,3%*	*5,0%*	*6,4%*	*2,9%*	*5,2%*
		b						b		
... Hypertendu diastolique non traité	*2,1%*	*1,9%*	*2,4%*	*3,7%*	*6,7%*	*1,2%*	*1,2%*	*0,6%*	*4,4%*	*1,3%*
					edc					

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd
Base		**569**	**211**	**157**	**66***	**135**
% horizontal		*100.0%*	*37.0%*	*27.6%*	*11.6%*	*23.7%*
Hypertension traitée controlée	Eff	174	58	57	17	42
	%v	*30.5%*	*27.4%*	*36.2%*	*26.3%*	*30.9%*
	Test					
Hypertension traitée non controlée	Eff	174	36	55	26	57
	%v	*30.6%*	*17.2%*	*34.9%*	*40.0%*	*42.0%*
	Test	A		A	A	Az
... Hypertension systolique isolée non controlée	Eff	85	16	31	11	27
	%v	*15.0%*	*7.7%*	*19.8%*	*16.2%*	*20.3%*
	Test	A		A		A
... Hypertension diastolique non controlée	Eff	15	5	1	1	8
	%v	*2.6%*	*2.2%*	*0.9%*	*2.1%*	*5.6%*
	Test					b
Normotendu	Eff	149	83	27	17	21
	%v	*26.1%*	*39.6%*	*17.2%*	*25.7%*	*15.7%*
	Test	Db	DBZc			
Hypertendu non traité	Eff	72	33	18	5	15
	%v	*12.7%*	*15.8%*	*11.7%*	*8.0%*	*11.4%*
	Test					
... Hypertendu systolique non traité	Eff	32	15	8	3	7
	%v	*5.6%*	*7.1%*	*4.8%*	*4.3%*	*4.9%*
	Test					
... Hypertendu diastolique non traité	Eff	17	11	3	1	2
	%v	*3.1%*	*5.4%*	*2.0%*	*1.1%*	*1.6%*
	Test		cd			

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total	BMI Répondant				
		Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**566**	**207**	**151**	**82***	**125**	**1****
% horizontal	*100,0%*	*36,5%*	*26,7%*	*14,5%*	*22,1%*	*0,2%*
Hypertension traitée controlée	*29,5%*	*26,5%*	*28,7%*	*33,1%*	*33,0%*	
Hypertension traitée non controlée	*30,5%*	*23,7%*	*31,7%*	*35,0%*	*37,1%* a	*100,0%* ZABDC
... Hypertension systolique isolée non controlée	*15,9%*	*15,6%*	*14,7%*	*12,7%*	*20,3%*	
... Hypertension diastolique non controlée	*4,1%*	*2,0%*	*4,4%*	*5,5%*	*6,5%*	
Normotendu	*27,7%* d	*38,2%* DCBZ	*25,0%*	*20,4%*	*18,8%*	
Hypertendu non traité	*12,3%*	*11,6%*	*14,6%*	*11,5%*	*11,0%*	
... Hypertendu systolique non traité	*5,0%* d	*6,3%* d	*5,8%*	*5,5%*	*1,8%*	
... Hypertendu diastolique non traité	*2,2%*	*1,1%*	*2,3%*	*2,0%*	*4,1%*	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%		Total Zz	BMI: Moins de 26 Aa	26 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd
Base		**569**	**211**	**157**	**66***	**135**
% horizontal		*100.0%*	*37.0%*	*27.6%*	*11.6%*	*23.7%*
Hypertension traitée controlée	Eff	216	70	70	21	55
	%v	*38.0%*	*33.2%*	*44.7%*	*31.5%*	*41.0%*
	Test			a		
Hypertension traitée non controlée	Eff	132	24	41	23	43
	%v	*23.2%*	*11.5%*	*26.4%*	*34.9%*	*31.9%*
	Test	A		A	A	Az
... Hypertension systolique isolée non controlée	Eff	68	11	24	11	22
	%v	*12.0%*	*5.4%*	*15.3%*	*17.0%*	*16.0%*
	Test	A		A	a	A
... Hypertension diastolique non controlée	Eff	17	4	5		8
	%v	*2.9%*	*1.7%*	*3.0%*		*6.2%*
	Test					a
Normotendu	Eff	180	101	34	18	26
	%v	*31.7%*	*48.1%*	*21.8%*	*27.3%*	*19.6%*
	Test	Db	DBZC			
Hypertendu non traité	Eff	41	15	11	4	10
	%v	*7.2%*	*7.2%*	*7.1%*	*6.4%*	*7.5%*
	Test					
... Hypertendu systolique non traité	Eff	19	4	7	3	5
	%v	*3.3%*	*2.1%*	*4.3%*	*3.9%*	*3.5%*
	Test					
... Hypertendu diastolique non traité	Eff	9	5	1	1	2
	%v	*1.5%*	*2.5%*	*0.4%*	*1.1%*	*1.4%*
	Test					

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n=569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon le BMI

Tests aux seuils 95 et 99%	Total	BMI Répondant				
		Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
Base	**566**	**207**	**151**	**82***	**125**	**1****
% horizontal	*100,0%*	*36,5%*	*26,7%*	*14,5%*	*22,1%*	*0,2%*
Hypertension traitée controlée	*39,4%*	*35,7%*	*40,6%*	*36,2%*	*46,3%*	
Hypertension traitée non controlée	*20,6%* a	*14,4%*	*19,8%*	*31,9%* Azb	*23,9%* a	*100,0%* ZABDC
... Hypertension systolique isolée non controlée	*12,3%*	*11,3%*	*9,0%*	*16,5%*	*15,3%*	
... Hypertension diastolique non controlée	*2,8%* A	*0,4%*	*2,6%*	*7,0%* a	*4,0%* a	
Normotendu	*30,8%* d	*40,5%* DCzb	*30,3%*	*23,5%*	*20,3%*	
Hypertendu non traité	*9,2%*	*9,4%*	*9,3%*	*8,4%*	*9,5%*	
... Hypertendu systolique non traité	*4,6%*	*6,1%*	*4,2%*	*4,6%*	*2,6%*	
... Hypertendu diastolique non traité	*2,1%*	*1,7%*	*0,9%*	*3,8%*	*3,4%*	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85 – Selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**569**	**167**	**402**	**200**	**153**	**41***	**5****	**162**	**135**	**19****	**7****	**40***
% horizontal		*100.0%*	*29.4%*	*70.6%*	*35.1%*	*27.0%*	*7.2%*	*0.9%*	*28.4%*	*23.7%*	*3.4%*	*1.3%*	*7.1%*
Hypertension traitee controlee	Eff	174		174	81	81			75	66	9		18
	%v	*30.5%*		*43.2%*	*40.4%*	*52.6%*			*46.5%*	*49.1%*	*46.9%*		*44.0%*
	Test			Z	z	Zdb			Z	Z			
Hypertension traitee non controlee	Eff	174		174	73	73			79	69	10		23
	%v	*30.6%*		*43.4%*	*36.4%*	*47.4%*			*48.8%*	*50.9%*	*53.1%*		*56.0%*
	Test			Z		Zd			Zd	ZD			Zd
... Hypertension systolique isolee non controlee	Eff	85		85	28	28			44	40	4		13
	%v	*15.0%*		*21.3%*	*14.0%*	*18.2%*			*27.4%*	*29.9%*	*20.4%*		*32.6%*
	Test			zd					ZD	ZDe			dz
... Hypertension diastolique non controlee	Eff	15		15	5	5			8	6	2		2
	%v	*2.6%*		*3.7%*	*2.7%*	*3.5%*			*5.0%*	*4.4%*	*11.2%*		*3.9%*
	Test												
Normolendu	Eff	149	121	27	24		24	1	3			3	
	%v	*26.1%*	*72.6%*	*6.8%*	*12.2%*		*57.9%*	*9.9%*	*1.9%*			*40.4%*	
	Test	HBD	HBDZG	H	Hb		HBDZG					h	
Hyperlendu non traite	Eff	72	46	26	22		17	5	4			4	
	%v	*12.7%*	*27.4%*	*6.6%*	*11.0%*		*42.1%*	*90.1%*	*2.7%*			*59.6%*	
	Test	HB	HBDZ	h	H		HBDZ	HBDZAF				HBDZ	
... Hyperlendu systolique non traite	Eff	32	15	17	16		12	3	1			1	
	%v	*5.6%*	*9.0%*	*4.2%*	*7.9%*		*30.4%*	*62.7%*	*0.7%*			*14.3%*	
	Test	H	Hb	H	H		HBZDA	HBZda					
... Hyperlendu diastolique non traite	Eff	17	14	3	1		1		2			2	
	%v	*3.1%*	*8.4%*	*0.9%*	*0.6%*		*3.1%*		*1.3%*			*29.3%*	
	Test	Db	DBHz										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon le moustique de risque

		Moustique de risque répondant											
	Total	**Individu sain**	**ST Au moins une pathologie**	Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
				Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	**566**	**171**	**395**	**204**	**156**	**41***	**7****	**156**	**124**	**24****	**8****	**35***
% horizontal	*100,0%*	***30,2%***	***69,8%***	*36,1%*	*27,6%*	*7,3%*	*1,2%*	*27,6%*	*21,9%*	*4,2%*	*1,2%*	*6,2%*
Hypertension traitée controlée	*29,5%*		***42,2%***	*32,8%*	*42,8%*			*52,8%*	*54,2%*	*62,9%*		*49,9%*
			Zc		Z			ZCb	ZCb	ZCb		z
Hypertension traitée non controlée	*30,5%*		***43,7%***	*43,8%*	*57,2%*			*42,2%*	*45,8%*	*37,1%*		*50,1%*
			Z	Z	ZBGc			Z	Z			z
... Hypertension systolique isolée non controlée	*15,9%*		***22,8%***	*23,9%*	*31,2%*			*19,0%*	*18,7%*	*26,9%*		*33,2%*
			Z	z	Zghb							z
... Hypertension diastolique non controlée	*4,1%*		***5,9%***	*4,5%*	*5,9%*			*6,9%*	*8,7%*			*9,5%*
Normotendu	*27,7%*	***70,5%***	***9,2%***	*15,6%*		*71,0%*	*40,0%*	*3,0%*			*59,3%*	
	GBC	**GBCZ**	**G**	Gb		GBCZ					GBc	
Hypertendu non traité	*12,3%*	***29,5%***	***4,8%***	*7,8%*		*29,0%*	*60,0%*	*2,0%*			*40,7%*	
	GB	**GBCZ**		G		GBCz	GBCz				gb	
... Hypertendu systolique non traité	*5,0%*	***10,9%***	***2,5%***	*3,9%*		*16,5%*	*18,6%*	*1,2%*			*24,0%*	
	Gb	**GBcz**				Gbc						
... Hypertendu diastolique non traité	*2,2%*	***4,9%***	***1,1%***	*2,1%*		*6,0%*	*27,0%*					
		b										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies Total Ll
Base		**569**	**167**	**402**	**200**	**153**	**41***	**5***	**162**	**135**	**19***	**7***	**40***
% horizontal		*100.0%*	*29.4%*	*70.6%*	*35.1%*	*27.0%*	*7.2%*	*0.9%*	*28.4%*	*23.7%*	*3.4%*	*1.2%*	*7.1%*
Hypertension traitee controlee	Eff	216		216	93	93			100	89	11		23
	%v	*38.0%*		*53.8%*	*46.4%*	*60.4%*			*62.1%*	*66.3%*	*57.2%*		*57.3%*
	Test			Z	z	ZD			ZD	ZDB			z
Hypertension traitee non controlee	Eff	132		132	61	61			54	45	8		17
	%v	*23.2%*		*32.8%*	*30.4%*	*39.6%*			*33.2%*	*33.7%*	*42.0%*		*42.7%*
	Test			Z		Z			z	z			z
... Hypertension systolique isolee non controlee	Eff	68		68	28	28			29	24	5		11
	%v	*12.0%*		*17.0%*	*14.1%*	*18.3%*			*18.1%*	*18.1%*	*24.9%*		*27.3%*
	Test			z									z
... Hypertension diastolique non controlee	Eff	17		17	9	9			7	4	2		1
	%v	*2.9%*		*4.2%*	*4.7%*	*6.1%*			*4.0%*	*3.2%*	*11.5%*		*2.2%*
	Test												
Normolendu	Eff	180	140	40	35		32	3	5			5	
	%v	*31.7%*	*83.7%*	*10.0%*	*17.5%*		*77.4%*	*61.9%*	*3.2%*			*68.1%*	
	Test	HBD	HBDZ	H	Hb		HBDZ	Hbd				HBDz	
Hyperlendu non traite	Eff	41	27	14	11		9	2	2			2	
	%v	*7.2%*	*16.3%*	*3.4%*	*5.6%*		*22.6%*	*38.1%*	*1.4%*			*30.9%*	
	Test	HB	HBDZ		h		HBdz						
... Hyperlendu systolique non traite	Eff	19	11	8	8		7	1					
	%v	*3.3%*	*6.3%*	*2.0%*	*4.0%*		*16.1%*	*25.9%*					
	Test		b				bcd						
... Hyperlendu diastolique non traite	Eff	9	7	1					1			1	
	%v	*1.5%*	*4.4%*	*0.3%*					*0.7%*			*14.8%*	
	Test	b	bh										

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 569)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon le moustique de risque

		Moustique de risque répondant										
	Total	Individu sain	ST Au moins une pathologie	Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
				Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95 et 99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
Base	566	171	395	204	156	41*	7**	156	124	24**	8**	35*
% horizontal	100,0%	30,2%	69,8%	36,1%	27,6%	7,3%	1,2%	27,6%	21,9%	4,2%	1,4%	6,2%
Hypertension traitée controlée	39,4%		56,4% Zc	46,6%	60,9% ZC			67,5% ZCb	71,2% ZCB	70,0% Zc		63,9% Z
Hypertension traitée non controlée	20,6%		29,6% Z	30,0% z	39,1% Zgb			27,5%	28,8%	30,0%		36,1%
... Hypertension systolique isolée non controlée	12,3%		17,6% z	15,4%	20,1% z			17,4%	17,5%	22,8%		31,4% z
... Hypertension diastolique non controlée	2,8%		4,0%	4,0%	5,2%			4,3%	5,3%			2,5%
Normotendu	30,8% GBC	77,6% GBCZ	10,5% G	17,2% Gb		76,9% GBCZ	53,5% gb	4,1%			83,3% GBCZ	
Hypertendu non traité	9,2% GB	22,4% GBCZ	3,5% g	6,2% G		23,1% GBcz	46,5% gbc	0,8%			16,7%	
... Hypertendu systolique non traité	4,6% b	9,9% Bzc	2,3%	4,5%		16,9% bzc	32,9%					
... Hypertendu diastolique non traité	2,1%	5,3% bcg	0,8%	0,9%		2,1%	13,6%	0,8%			16,7%	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

KANTAR HEALTH

3.4.4 Mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque en automesure

Méthode de calcul PAS / PAD / FICARD

- PAS = moyenne des 3 mesures ou moins de SYS
- PAD = moyenne des 3 mesures ou moins de DIA
- FICARD = moyenne des 3 mesures PULSE
- Parmi les individus interrogés, 722 possèdent un appareil d'automesure, dont :

  569 individus ayant rempli leurs 3 mesures de PAS, PAD et FICARD

Base d'analyse retenue

PAS / PAD – 2012

Analyse selon le traitement, le sexe, l'âge et l'activité

Tests aux seuils 95,99%	TOTAL	Sexe		Age					PCS Individu	
		Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	Actifs	Inactifs
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI
PAS	130,74	133,23	128,26	122,56	128,25	128,16	131,40	135,62	127,39	131,78
	15,4	14,8	15,5	14,6	13,2	14,8	14,6	16,0	14,4	15,5
	578	288	290	43	83	131	158	162	137	441
	130,0	131,7	128,3	122,0	129,3	128,3	131,1	135,0	128,3	131,0
	88,5	98,7	88,5	93,0	99,3	92,0	88,5	92,0	93,0	88,5
	185,0	182,3	185,0	160,3	160,7	166,7	171,0	185,0	160,7	185,0
	Chb	Bz			c	c	C	CEDZf		H
PAD	77,56	78,94	76,21	74,08	80,36	78,45	77,24	76,66	78,77	77,18
	11,0	10,9	11,0	9,8	10,8	11,0	10,5	11,5	10,8	11,1
	569	283	286	43	83	128	156	159	137	431
	76,7	77,3	75,3	74,6	79,4	78,0	76,3	75,3	78,0	76,3
	51,5	56,3	51,5	54,0	61,3	60,0	51,5	51,5	54,0	51,5
	130,0	120,0	130,0	97,0	102,0	120,0	110,0	130,0	102,0	130,0
	c	B			Cgzf	c				
FICARD	68,21	66,56	69,84	72,52	72,86	68,52	67,67	64,80	72,18	66,94
	11,5	11,9	10,9	10,3	13,3	10,5	11,1	10,7	12,5	10,9
	561	277	284	43	81	131	154	153	136	425
	66,7	65,0	68,3	71,3	70,8	68,5	66,3	63,3	70,7	65,7
	41,0	41,0	45,0	54,3	45,7	41,0	43,3	42,0	41,0	42,0
	106,0	106,0	97,3	95,3	106,0	98,0	103,0	99,7	106,0	103,0
	G		Az	GFZe	GFZe	G	g		IZ	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – 2012

Analyse selon le traitement, le sexe, l'âge et l'activité

Tests 95,99		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS individu: Actifs Hh	PCS individu: Inactifs Ii
PAS	Moy.	130.74	133.23	128.26	122.56	128.25	128.16	131.40	135.62	127.39	131.78
	Ect	15.4	14.8	15.5	14.6	13.2	14.8	14.6	16.0	14.4	15.5
	N.	578	288	290	43	83	131	158	162	137	441
	Méd.	130.0	131.7	128.3	122.0	129.3	128.3	131.1	135.0	128.3	131.0
	Min	88.5	98.7	88.5	93.0	99.3	92.0	88.5	92.0	93.0	88.5
	Max	185.0	182.3	185.0	160.3	160.7	166.7	171.0	185.0	160.7	185.0
	T-Test	Chb	Bz			c	c	C	CEDZf		H
PAD	Moy.	77.56	78.94	76.21	74.08	80.36	78.45	77.24	76.66	78.77	77.18
	Ect	11.0	10.9	11.0	9.8	10.8	11.0	10.5	11.5	10.8	11.1
	N.	569	283	286	43	83	128	156	159	137	431
	Méd.	76.7	77.3	75.3	74.6	79.4	78.0	76.3	75.3	78.0	76.3
	Min	51.5	56.3	51.5	54.0	61.3	60.0	51.5	51.5	54.0	51.5
	Max	130.0	120.0	130.0	97.0	102.0	120.0	110.0	130.0	102.0	130.0
	T-Test	c	B			Cgzf	c				

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – Rappel 2010

Analyse selon le traitement, le sexe, l'âge et l'activité

	TOTAL	Traitement		Sexe		Age					PCS Individu	
		Traité pour HTA	Non Traité	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	eE	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
PAS												
Moyenne	130,41	133,51	125,69	133,67	127,42	121,31	125,72	128,64	133,69	134,09	127,00	131,63
ET	16,2	15,2	16,6	16,3	15,5	13,4	15,0	17,3	14,0	17,0	15,0	16,5
Effectif	573	346	228	274	300	48	90	124	161	150	152	422
Médiane	130,0	133,0	125,3	133,0	127,3	122,5	127,5	129,0	133,3	132,7	127,4	131,3
Min	90,7	95,3	90,7	97,7	90,7	93,3	90,7	94,7	100,7	97,7	95,3	90,7
Max	195,5	195,5	191,3	195,5	186,3	153,3	174,7	186,7	191,3	195,5	186,7	195,5
T-Test	B	EBZ		BZ				A	ABCz	ABCz		A
PAD												
Moyenne	77,38	78,03	76,41	78,77	76,09	78,82	79,39	77,19	77,75	75,46	78,67	76,91
ET	11,3	11,0	11,6	11,4	11,0	13,2	11,4	11,2	10,2	11,3	10,7	11,4
Effectif	566	340	226	273	293	48	90	122	157	149	152	414
Médiane	76,7	77,3	76,0	77,5	75,7	77,0	78,9	75,0	77,1	75,0	77,7	76,3
Min	50,0	51,0	50,0	50,0	53,3	53,7	57,0	50,0	51,0	52,7	50,0	51,0
Max	130,0	130,0	123,3	130,0	123,3	123,3	105,7	130,0	122,5	116,7	113,3	130,0
T-Test				B			E					

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – 2012
Analyse selon le BMI

Tests 95,99		Total Zz	BMI: Moins de 25 Aa	25 à 27.9 Bb	28 à 29.9 Cc	30 et plus (Obésité) Dd
PAS	Moy.	130.74	124.92	133.81	134.30	134.32
	Ect	15.4	14.7	15.0	15.4	14.1
	N.	578	212	157	66	143
	Med.	130.0	124.3	131.7	132.0	133.0
	Min	88.5	88.5	102.3	98.7	98.7
	Max	185.0	172.3	182.3	164.0	185.0
	T-Test	A		Az	A	AZ
PAD	Moy.	77.56	75.36	77.68	79.43	79.96
	Ect	11.0	10.8	10.7	11.4	10.8
	N.	569	211	157	66	135
	Med.	76.7	75.0	77.2	76.3	79.0
	Min	51.5	51.5	56.3	60.0	56.0
	Max	130.0	130.0	115.0	110.0	120.0
	T-Test	a		a	a	Az

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – Rappel 2010

Analyse selon le BMI

Tests aux seuils 95,99%	TOTAL	BMI Répondant				
		Moins de 25	25 à 27.9	28 à 29.9	30 et plus (Obésité)	Non précisé
	zZ	aA	bB	cC	dD	eE
PAS						
Moyenne	130,41	126,85	132,79	133,67	131,12	140,33
ET	16,2	16,9	15,8	15,6	14,8	
Effectif	573	208	153	85	126	1
Médiane	130,0	126,0	132,3	131,5	130,0	140,3
Min	90,7	93,3	97,0	97,7	90,7	140,3
Max	195,5	195,5	191,3	190,0	174,7	140,3
T-Test	A		A	A	a	ZADBC
PAD						
Moyenne	77,38	74,81	79,11	79,53	77,99	95,67
ET	11,3	11,0	11,8	10,7	10,5	0,0
Effectif	566	207	151	82	125	1
Médiane	76,7	74,7	79,3	77,2	77,0	95,7
Min	50,0	50,0	51,0	62,0	55,7	95,7
Max	130,0	123,3	130,0	116,7	104,0	95,7
T-Test	A		A	A	A	ZADBC

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests 95,99		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
PAS	Moy.	130.74	123.14	133.83	133.36	133.68	131.05	141.87	133.70	133.42	136.52	131.60	136.48
	Ect	15.4	14.2	14.8	14.4	14.4	14.6	9.0	15.2	14.9	17.5	12.5	14.5
	N.	578	167	411	203	157	41	5	163	137	19	7	44
	Méd.	130.0	121.7	133.0	132.3	132.3	130.7	136.2	133.3	133.3	132.0	130.4	134.8
	Min	88.5	92.0	88.5	88.5	102.3	88.5	129.7	98.7	98.7	110.7	109.3	102.0
	Max	185.0	172.3	185.0	171.0	171.0	164.0	153.7	185.0	185.0	182.3	154.0	169.0
	T-Test	A		AZ	Az	Az	A	AZ'dbe	Az	A	A		Az
PAD	Moy.	77.56	75.36	78.48	78.96	79.43	77.06	79.83	77.99	77.22	80.49	85.46	78.12
	Ect	11.0	9.8	11.3	11.4	12.1	9.0	6.5	11.1	10.6	9.4	18.2	11.5
	N.	569	167	402	200	153	41	5	162	135	19	7	40
	Méd.	76.7	75.0	77.0	78.0	79.2	76.3	77.4	77.0	76.5	82.0	83.7	76.7
	Min	51.5	54.0	51.5	55.0	55.0	61.3	73.3	51.5	51.5	63.0	56.0	60.3
	Max	130.0	101.3	130.0	130.0	130.0	106.3	90.7	120.0	115.0	96.0	120.0	110.0
	T-Test	a		A	A	A			a		a		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

PAS / PAD – Rappel 2010

Analyse selon le moustique de risque

	Moustique de risque répondant											
				Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
	Total	**Individu sain**	**ST Au moins une pathologie**	Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95,99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
PAS												
Moyenne	130,41	**124,53**	**132,93**	133,74	135,14	128,00	135,76	131,57	131,85	130,49	130,36	134,28
ET	16,2	**16,6**	**15,4**	15,9	15,2	17,7	10,6	15,5	16,3	13,0	6,5	10,3
Effectif	573	**172**	**401**	207	159	41	7	159	128	24	8	35
Médiane	130,0	**123,3**	**132,0**	132,7	135,0	126,0	130,9	131,3	131,3	127,8	129,3	133,2
Min	90,7	**90,7**	**95,3**	95,3	95,3	99,7	123,0	97,7	97,7	110,0	120,0	115,3
Max	195,5	**180,0**	**195,5**	195,5	195,5	191,3	153,0	186,3	186,3	158,7	139,0	164,3
T-Test	A		**Az**	Az	AZeg		A	A	A	a	a	Az
PAD												
Moyenne	77,38	**76,61**	**77,71**	79,02	80,15	74,24	81,90	76,39	76,45	75,29	78,81	76,02
ET	11,3	**11,7**	**11,1**	11,7	11,5	11,5	9,1	10,3	10,6	9,1	8,8	9,5
Effectif	566	**171**	**395**	204	156	41	7	156	124	24	8	35
Médiane	76,7	**76,4**	**76,7**	78,3	79,3	73,7	77,3	75,7	75,0	74,3	79,7	76,3
Min	50,0	**50,0**	**51,0**	51,0	51,0	53,3	72,0	54,7	55,0	54,7	63,3	52,7
Max	130,0	**123,3**	**130,0**	130,0	130,0	122,5	100,3	103,7	103,7	98,0	94,3	96,0
T-Test				egha	GEHAZib							

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque – 2012

Analyse selon le traitement, le sexe, l'âge et l'activité

			Sexe		Age					PCS Individu	
		TOTAL Zz	Homme Aa	Femme Bb	35-44 ans Cc	45-54 ans Dd	55-64 ans Ee	65-74 ans Ff	75 ans et plus Gg	Actifs Hh	Inactifs Ii
FICARD	Moy.	68.21	66.56	69.84	72.52	72.86	68.52	67.67	64.80	72.18	66.94
	Ect	11.5	11.9	10.9	10.3	13.3	10.5	11.1	10.7	12.5	10.9
	N.	561	277	284	43	81	131	154	153	136	425
	Med.	66.7	65.0	68.3	71.3	70.8	68.5	66.3	63.3	70.7	65.7
	Min	41.0	41.0	45.0	54.3	45.7	41.0	43.3	42.0	41.0	42.0
	Max	106.0	106.0	97.3	95.3	106.0	98.0	103.0	99.7	106.0	103.0
	T-Test	G		Az	GFZe	GFZe	G	g		IZ	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque – Rappel 2010

Analyse selon le traitement, le sexe, l'âge et l'activité

	TOTAL	Traitement		Sexe		Age					PCS Individu	
		Traité pour HTA	Non Traité	Homme	Femme	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	ST Actifs	ST Inactifs
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	eE	aA	bB	aA	bB	cC	dD	eE	aA	bB
FICARD												
Moyenne	68,58	67,74	69,85	66,33	70,61	72,61	70,39	70,06	67,55	66,10	70,05	68,06
ET	10,9	10,8	11,0	10,5	10,9	14,8	9,3	11,5	10,1	10,0	10,8	10,9
Effectif	565	340	224	268	297	47	87	124	157	149	148	417
Médiane	67,3	66,3	68,8	65,3	69,0	70,5	68,8	67,8	66,7	65,3	69,0	66,7
Min	40,3	40,3	41,0	40,3	45,3	41,0	54,7	45,3	43,0	40,3	41,0	40,3
Max	120,0	107,3	120,0	107,3	120,0	120,0	91,7	107,3	98,3	98,3	107,3	120,0
T-Test	A		da		AZ	Ed	Ed	E				

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque – 2012

Selon le moustique de risque

		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
FICARD	Moy.	68.21	69.65	67.62	67.67	67.67	66.72	75.07	66.85	65.07	73.34	81.84	70.50
	Ect	11.5	10.7	11.8	11.3	11.2	11.1	14.2	12.5	11.8	10.1	13.7	10.4
	N.	561	165	397	198	154	39	5	160	133	19	7	39
	Méd.	66.7	68.0	66.0	65.7	65.7	63.3	78.3	65.0	63.3	71.7	81.1	71.1
	Min	41.0	43.3	41.0	45.0	45.0	54.3	54.3	41.0	41.0	52.0	61.0	47.0
	Max	106.0	98.0	106.0	105.0	105.0	99.7	97.0	106.0	103.0	95.0	106.0	90.0
	T-Test	I	Ihb	i	i						IHbdefz	IHFBDEZ	I

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure (n= 722)

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque – Rappel 2010

Selon le moustique de risque

	Moustique de risque répondant											
	Total	**Individu sain**	**ST Au moins une pathologie**	Individu présentant 1 seule pathologie				Individu présentant 2 pathologies				Individu présentant 3 pathologies
				Total	Hypertendu	Dyslipidémique	Diabétique	Total	Hypertendu et dyslipidémique	Hypertendu et diabétique	Dyslipidémique et Diabétique	
Tests aux seuils 95,99%	zZ	**aA**	**bB**	cC	dD	eE	fF	gG	hH	iI	jJ	kK
FICARD												
Moyenne	68,58	**70,07**	**67,94**	68,91	68,79	68,37	74,88	66,55	65,57	71,09	68,60	68,65
ET	10,9	**11,2**	**10,8**	10,5	10,5	10,1	12,5	11,2	11,0	11,7	7,7	9,8
Effectif	565	**169**	**396**	202	155	41	7	159	127	24	8	35
Médiane	67,3	**69,3**	**66,7**	67,7	67,7	66,3	73,8	65,3	65,0	65,8	68,3	68,1
Min	40,3	**41,0**	**40,3**	43,0	43,0	49,3	56,0	40,3	40,3	56,0	58,0	52,0
Max	120,0	**120,0**	**107,3**	98,3	98,3	87,7	90,3	107,3	107,3	100,0	77,7	94,3
T-Test	Hg	**HGb**	**h**	Hg	h					h		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85

		TOTAL Zz	UHP2. Classification du statut tensionnel répondant							
			Hypertension traitée controlée Aa	Hypertension traitée non controlée Bb	... Hyper tension systolique isolée non controlée Cc	... Hyper tension diastolique non controlée Dd	Normotendu Ee	Hypertendu non traité Ff	... Hyper tendu systolique non traité Gg	... Hyper tendu diastolique non traité Hh
FICARD	Moy.	68.21	67.59	66.89	63.83	68.28	69.31	70.26	67.76	75.86
	Ect	11.5	10.7	12.4	12.0	9.9	10.7	12.3	12.0	10.7
	N.	561	168	172	85	15	145	71	31	17
	Med.	66.7	66.7	65.0	61.8	72.0	68.0	68.0	64.3	73.0
	Min	41.0	41.0	42.3	42.3	49.3	44.3	43.3	43.3	57.7
	Max	106.0	96.7	105.0	103.0	80.0	99.7	106.0	97.0	94.7
	T-Test	Cl	c				C	C		CBAZgcd

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
FICARD									
Moyenne	68,44	67,50	67,58	65,85	74,23	69,65	70,12	66,34	80,19
ET	10,9	10,3	11,2	10,2	12,5	10,2	12,5	9,8	18,0
Effectif	558	163	172	89	23	155	68	27	13
Médiane	67,0	66,7	65,3	64,5	72,5	68,7	69,3	65,8	78,2
Min	40,3	40,3	43,0	43,0	57,0	45,3	41,0	41,0	60,3
Max	120,0	100,0	107,3	92,0	107,3	100,5	120,0	86,3	120,0
T-Test	c				Cagbz	C	c		Cgabze

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90

UHP2b. Classification du statut tensionnel répondant							
Hyperten sion traitée controlée Ii	Hyperten sion traitée non controlée Jj	... Hyper tension systolique isolée non controlée Kk	... Hyper tension diastoli que non controlée Ll	Normotendu Mm	Hypertendu non traité Nn	... Hyper tendu sys tolique non traité Oo	... Hyper tendu dias tolique non traité Pp
	67.18	67.33	65.02	70.41	69.82	68.76	66.99
	10.8	12.7	12.4	12.8	10.9	12.9	11.6
	210	131	68	17	175	41	19
	66.0	66.0	64.3	67.8	68.0	65.7	65.3
	41.0	42.3	42.3	52.7	44.3	43.3	43.3
	103.0	105.0	93.7	95.3	99.7	106.0	93.3
					Lj		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
FICARD									
Moyenne	68,44	67,66	67,33	65,93	75,65	69,90	69,43	64,92	76,58
ET	10,9	10,4	11,4	10,4	13,0	10,0	13,7	10,8	19,9
Effectif	558	218	117	69	16	172	51	25	12
Médiane	67,0	66,5	65,7	65,3	72,0	69,0	67,7	63,8	75,7
Min	40,3	40,3	43,0	43,0	58,3	45,3	41,0	41,0	54,3
Max	120,0	100,0	107,3	98,3	107,3	100,5	120,0	90,3	120,0
T-Test					CGbaz	Cgab			

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85 – Selon l'âge (1/2)

			UHP2. Classification du statut tensionnel répondant							
		TOTAL Zz	Hypertension traitée contrôlée Aa	Hypertension traitée non contrôlée Bb	... Hypertension systolique isolée non contrôlée Cc	... Hypertension diastolique non contrôlée Dd	Normotendu Ee	Hypertendu non traité Ff	... Hypertendu systolique non traité Gg	... Hypertendu diastolique non traité Hh
Age: 35-44 ans										
FICARD	Moy.	72.52	76.14	77.04	72.91		69.55	84.49	84.75	84.00
	Ect	10.3	8.4	12.4	8.7		9.2	1.6	2.0	
	N.	43	6	6	3		29	3	2	1
	Med.	71.3	75.0	72.8	72.1		68.0	83.9	84.3	84.0
	Min	54.3	66.7	64.7	64.7		54.3	83.0	83.0	84.0
	Max	95.3	87.7	95.3	82.0		94.7	87.0	87.0	84.0
	T-Test	L						EZac	EZac	EZac
Age: 45-54 ans										
FICARD	Moy.	72.86	75.88	72.13	62.67	75.67	70.13	77.05	81.00	78.64
	Ect	13.3	6.6	15.1			13.1	16.0		11.6
	N.	81	17	19	2	2	33	12	1	7
	Med.	70.8	78.0	66.0	62.7	75.7	66.8	73.0	81.0	73.0
	Min	45.7	66.7	55.7	62.7	75.7	45.7	50.0	81.0	68.0
	Max	106.0	85.3	106.0	62.7	75.7	97.3	106.0	81.0	94.7
	T-Test	CL	Ce	C		e	C	C	ZEAb	C
Age: 55-64 ans										
FICARD	Moy.	68.52	66.93	67.49	68.90	69.43	69.25	70.85	65.57	74.24
	Ect	10.5	11.6	11.2	13.3	10.4	8.8	9.2	5.3	9.9
	N.	131	43	32	14	5	32	20	5	6
	Med.	68.5	65.3	67.4	68.7	70.9	70.7	69.4	63.3	71.3
	Min	41.0	41.0	46.7	46.7	52.7	52.0	54.7	59.3	57.7
	Max	98.0	96.7	87.0	87.0	79.3	98.0	90.0	74.7	87.7
	T-Test									

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 135-85 – Selon l'âge (2/2)

		TOTAL Zz	UHP2. Classification du statut tensionnel répondant							
			Hypertension traitée controlée Aa	Hypertension traitée non controlée Bb	... Hyper tension systolique isolée non controlée Cc	... Hyper tension diastolique non controlée Dd	Normotendu Ee	Hypertendu non traité Ff	... Hyper tendu systolique non traité Gg	... Hyper tendu diastolique non traité Hh
Age: 65-74 ans										
FICARD	Moy.	67.67	67.29	68.35	65.16	68.03	67.09	67.80	68.18	67.89
	Ect	11.1	10.4	11.5	12.0	5.4	10.8	13.3	17.7	7.0
	N.	154	54	56	30	4	33	10	4	2
	Med.	66.3	65.2	68.0	62.3	68.0	64.8	67.3	67.3	70.0
	Min	43.3	51.3	47.0	47.0	60.0	44.3	43.3	43.3	59.0
	Max	103.0	95.0	103.0	103.0	75.3	90.3	97.0	97.0	76.0
	T-Test	0								
Age: 75 ans et plus										
FICARD	Moy.	64.80	64.50	62.47	60.06	61.22	71.50	65.84	65.26	75.81
	Ect	10.7	9.5	11.2	10.6	11.8	10.3	9.7	10.3	9.5
	N.	153	48	59	36	3	19	26	18	2
	Med.	63.3	64.0	60.1	58.8	56.8	68.7	64.3	64.0	71.7
	Min	42.0	42.0	42.3	42.3	49.3	56.0	53.7	53.7	68.0
	Max	99.7	89.3	93.7	93.7	80.0	99.7	93.3	93.3	87.3
	T-Test	c	c				CBZa	c		c

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon l'âge (1/2)

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Age: 35-44 ans									
Moyenne	72,61	69,70	73,37		73,33	71,10	82,04	60,19	101,30
ET	14,8	8,4	2,3			12,0	27,7	22,4	18,9
Effectif	47	8	5		1	28	7	2	4
Médiane	70,5	68,8	73,0		73,3	67,0	82,8	52,7	100,0
Min	41,0	55,0	70,7		73,3	46,7	41,0	41,0	80,0
Max	120,0	88,7	77,0		73,3	100,5	120,0	86,3	120,0
T-Test									AEZDBg
Age: 45-54 ans									
Moyenne	70,39	70,78	70,55	66,66	73,22	70,24	70,14		70,22
ET	9,3	7,2	11,1	4,3	12,7	9,1	6,3		8,6
Effectif	87	10	27	7	11	40	10		2
Médiane	68,8	68,7	67,7	66,8	79,7	71,0	69,8		71,6
Min	54,7	62,7	54,7	62,3	57,0	55,3	60,3		60,3
Max	91,7	85,3	88,7	73,3	88,7	91,7	77,7		77,7
T-Test									
Age: 55-64 ans									
Moyenne	69,91	68,38	70,74	70,61	83,92	71,00	70,00	67,84	70,28
ET	11,5	11,9	13,1	12,9	16,7	9,3	9,7	5,9	8,6
Effectif	122	42	35	20	4	32	13	4	3
Médiane	67,7	66,7	67,0	67,5	78,2	70,7	67,5	66,5	64,3
Min	45,3	47,0	53,0	53,0	65,7	45,3	52,0	61,0	63,0
Max	107,3	100,0	107,3	92,0	107,3	87,7	90,3	76,7	80,3
T-Test									

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon l'âge (2/2)

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Age: 65-74 ans									
Moyenne	67,31	67,12	66,57	65,62	68,60	69,00	67,52	64,95	75,22
ET	10,0	8,9	10,7	10,0	5,6	10,5	9,6	8,8	9,3
Effectif	154	49	55	32	5	27	23	13	3
Médiane	66,4	67,0	65,3	64,4	70,2	66,0	65,9	62,8	75,9
Min	43,0	48,3	43,0	43,0	58,3	55,0	52,3	52,3	62,0
Max	98,3	94,3	98,3	86,0	75,0	93,7	85,0	78,3	85,0
T-Test									
Age: 75 ans et plus									
Moyenne	65,93	66,20	64,42	62,80	75,95	66,44	69,08	69,16	70,67
ET	9,9	10,5	9,7	8,1	7,3	9,6	7,2	6,5	
Effectif	148	54	51	31	2	28	15	9	1
Médiane	65,3	64,5	63,8	60,5	74,3	66,3	69,4	68,3	70,7
Min	40,3	40,3	47,3	48,3	69,3	49,3	58,7	59,3	70,7
Max	98,3	94,0	98,3	80,7	84,0	85,3	84,3	84,3	70,7
T-Test					cb		Cb	c	ZCBAe

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'âge (1/2)

			UHP2b. Classification du statut tensionnel répondant						
		TOTAL Zz	Hypertension traitée contrôlée Ii	Hypertension traitée non contrôlée Jj	... Hypertension systolique isolée non contrôlée Kk	... Hypertension diastolique non contrôlée Ll	Normotendu Mm	Hypertendu non traité Nn	... Hypertendu systolique non traité Oo	... Hypertendu diastolique non traité Pp
Age: 35-44 ans										
FICARD	Moy.	72.52		77.25	75.58	64.67	95.33	70.57	83.00	83.00
	Ect	10.3		7.9	13.8			9.7		
	N.	43		7	5	1	1	30	1	1
	Med.	71.3		75.5	67.3	64.7	95.3	68.0	83.0	83.0
	Min	54.3		66.7	64.7	64.7	95.3	54.3	83.0	83.0
	Max	96.3		87.7	95.3	64.7	95.3	94.7	83.0	83.0
	T-Test	L		L			ZNJK	L	NZ	NZ
Age: 45-54 ans										
FICARD	Moy.	72.52		74.61	73.13	66.00	65.77	71.47	74.64	75.83
	Ect	10.3		7.4	15.6		8.5	13.6	17.1	5.2
	N.	43		19	17	2	6	37	8	3
	Med.	71.3		77.8	69.3	66.0	64.3	68.0	73.0	75.8
	Min	54.3		62.7	55.7	66.0	55.7	45.7	50.0	70.7
	Max	96.3		85.3	105.0	66.0	75.7	97.3	106.0	81.0
	T-Test	L		Lm				I		Lm
Age: 55-64 ans										
FICARD	Moy.	72.52		67.79	65.57	69.01	62.69	69.43	71.10	65.55
	Ect	10.3		11.4	11.2	13.3	9.7	8.7	9.7	5.0
	N.	43		54	21	9	4	39	13	2
	Med.	71.3		67.5	66.0	67.1	59.7	70.5	69.7	64.7
	Min	54.3		41.0	46.7	46.7	52.7	52.0	54.7	59.3
	Max	96.3		96.7	87.0	87.0	78.0	98.0	90.0	69.7
	T-Test	L								

** Question non présente dans le questionnaire de 2007*

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon l'âge (2/2)

		UHP2b. Classification du statut tensionnel répondant							
		Hypertension traitée contrôlée Ii	Hypertension traitée non contrôlée Jj	... Hypertension systolique isolée non contrôlée Kk	... Hypertension diastolique non contrôlée Ll	Normolendu Mm	Hypertendu non traité Nn	... Hypertendu systolique non traité Oo	... Hypertendu diastolique non traité Pp
Age: 65-74 ans									
FICARD	Moy.		66.66	69.72	68.88	69.57	68.33	56.19	55.54
	Ect		11.2	10.4	10.9	4.9	11.2	8.1	10.7
	N.		68	42	25	2	39	4	2
	Med.		64.8	69.8	69.4	72.0	67.2	56.7	52.5
	Min		48.3	47.0	47.0	63.3	44.3	43.3	43.3
	Max		103.0	92.3	92.3	75.0	97.0	65.7	65.7
	T-Test		a	O	O	a	O		
Age: 75 ans et plus									
FICARD	Moy.		63.75	62.88	60.46	85.42	69.47	65.77	65.41
	Ect		8.9	12.3	12.6	4.6	9.9	10.8	11.3
	N.		61	46	30	2	30	15	10
	Med.		63.3	60.0	58.1	85.3	68.0	64.0	64.2
	Min		42.0	42.3	42.3	80.0	53.7	54.3	54.3
	Max		89.3	93.7	93.7	89.3	99.7	93.3	93.3
	T-Test					JLZKONP	LJKz		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon l'âge (1/2)

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Age: 35-44 ans									
Moyenne	72,61	70,99	71,45		70,67	71,77	81,91	60,19	120,00
ET	14,8	7,7	0,8			11,9	32,3	22,4	
Effectif	47	11	2		1	30	5	2	2
Médiane	70,5	71,7	71,4		70,7	68,4	74,7	52,7	120,0
Min	41,0	55,0	70,7		70,7	46,7	41,0	41,0	120,0
Max	120,0	88,7	72,3		70,7	100,5	120,0	86,3	120,0
T-Test									BEZAGF
Age: 45-54 ans									
Moyenne	70,39	67,87	74,34	66,66	83,70	70,19	70,34	61,33	72,47
ET	9,3	10,0	9,1	4,3	2,7	9,0	6,6		6,4
Effectif	87	21	16	7	5	41	9	1	6
Médiane	68,8	64,0	73,3	66,8	82,3	70,8	70,3	61,3	75,8
Min	54,7	54,7	62,3	62,3	81,3	55,3	60,3	61,3	60,3
Max	91,7	88,7	87,7	73,3	87,7	91,7	77,7	61,3	77,7
T-Test	G	G	GCa	G	GZCEAFH	G	G		G
Age: 55-64 ans									
Moyenne	69,91	69,16	70,15	69,84	76,14	71,09	69,43	70,04	63,00
ET	11,5	12,6	12,4	10,3	20,0	9,2	10,2	12,9	
Effectif	122	54	23	12	4	35	10	5	1
Médiane	67,7	66,7	67,1	67,6	66,8	70,7	66,9	72,7	63,0
Min	45,3	47,0	56,7	56,7	58,7	45,3	52,0	52,0	63,0
Max	107,3	100,0	107,3	88,3	107,3	87,7	90,3	90,3	63,0
T-Test	H	H	H	h		H	h		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon l'âge (2/2)

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Age: 65-74 ans									
Moyenne	67,31	67,27	65,98	67,07	64,53	69,34	66,05	61,72	67,76
ET	10,0	8,7	11,8	13,1	5,5	10,0	10,0	8,0	15,2
Effectif	154	69	36	24	3	34	16	8	2
Médiane	66,4	67,0	65,0	68,1	62,8	69,7	63,9	61,7	63,7
Min	43,0	48,3	43,0	43,0	58,3	55,0	52,3	52,3	54,3
Max	98,3	94,3	98,3	98,3	72,0	93,7	85,0	78,0	85,0
T-Test						g			
Age: 75 ans et plus									
Moyenne	65,93	66,18	63,99	63,04	73,28	67,13	68,08	66,41	59,67
ET	9,9	10,3	10,0	7,7	7,6	9,4	7,2	5,2	
Effectif	148	64	40	27	3	32	11	8	1
Médiane	65,3	64,7	62,4	62,1	71,0	66,5	67,7	66,9	59,7
Min	40,3	40,3	47,3	48,3	65,3	49,3	58,7	58,7	59,7
Max	98,3	94,0	98,3	83,0	84,0	85,3	84,3	76,0	59,7
T-Test	H	H	H	h	Hc	H	H	H	

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel - 2012

Seuil 135-85 – Selon le sexe

			UHP2. Classification du statut tensionnel répondant							
		TOTAL Zz	Hypertension traitée controlée Aa	Hypertension traitée non controlée Bb	... Hyper tension systolique isolée non controlée Cc	... Hyper tension diastolique non controlée Dd	Normotendu Ee	Hypertendu non traité Ff	... Hyper tendu systolique non traité Gg	... Hyper tendu diastolique non traité Hh
Homme										
FICARD	Moy.	66.56	65.72	65.89	63.67	64.85	66.46	69.26	66.65	73.71
	Ect	11.9	10.0	13.2	13.6	11.2	11.3	12.5	11.9	8.7
	N.	277	83	91	40	9	59	43	21	6
	Méd.	65.0	65.3	64.2	61.3	64.0	64.3	67.7	63.4	70.0
	Min	41.0	41.0	42.3	42.3	49.3	44.3	43.3	43.3	59.0
	Max	106.0	89.0	105.0	103.0	79.3	99.7	106.0	93.3	85.3
	T-Test									cabz
Femme										
FICARD	Moy.	69.84	69.40	68.01	63.97	72.87	71.26	71.82	70.21	77.10
	Ect	10.9	11.0	11.4	10.5	5.0	9.8	11.8	11.8	11.5
	N.	284	85	82	45	6	86	28	9	11
	Méd.	68.3	68.0	66.0	62.3	73.9	71.0	68.0	65.7	73.0
	Min	45.0	45.0	45.0	45.0	63.3	47.0	53.7	53.7	57.7
	Max	97.3	96.7	95.3	87.0	80.0	97.3	97.0	97.0	94.7
	T-Test	Cpl	C	c		Cb	Cb	C		Cbaz

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 135-85 – Selon le sexe

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Homme									
Moyenne	66,26	65,34	66,85	65,06	72,74	66,88	65,19	63,00	78,71
ET	10,5	10,0	11,5	11,2	13,0	10,0	8,6	8,0	9,0
Effectif	267	67	103	53	15	61	35	17	2
Médiane	65,3	65,3	65,3	61,7	72,1	66,1	65,2	64,0	82,7
Min	40,3	40,3	43,0	43,0	57,0	45,3	41,0	41,0	63,0
Max	107,3	90,0	107,3	89,3	107,3	91,7	85,0	76,7	85,0
T-Test					gcaf				gcfaz
Femme									
Moyenne	70,44	69,01	68,67	67,00	77,04	71,46	75,47	71,87	80,51
ET	10,9	10,1	10,7	8,6	11,0	9,9	13,9	10,1	19,4
Effectif	292	96	69	37	8	93	33	10	10
Médiane	68,7	67,8	66,7	66,8	82,4	70,4	75,7	74,7	77,7
Min	45,3	45,3	47,3	52,7	61,3	46,7	54,3	54,3	60,3
Max	120,0	100,0	98,3	92,0	88,7	100,5	120,0	86,3	120,0
T-Test	c				cba	c	Cbaz		c

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – 2012

Seuil 140-90 – Selon le sexe

			UHP2b. Classification du statut tensionnel répondant						
	TOTAL Zz	Hyperten sion traitée controlée Ii	Hyperten sion traitée non controlée Jj	... Hyper tension systolique isolée non controlée Kk	... Hyper tension diastoli que non controlée Ll	Normotendu Mm	Hypertendu non traité Nn	... Hyper tendu sys tolique non traité Oo	... Hyper tendu dias tolique non traité Pp
Homme									
FICARD Moy.			65.48	66.32	65.10	64.64	67.09	69.15	67.57
Ect			10.6	13.3	13.1	13.0	10.8	14.3	13.3
N.			105	69	33	8	75	27	14
Méd.			65.0	64.9	65.4	57.8	64.3	66.0	64.3
Min			41.0	42.3	42.3	52.7	44.3	43.3	43.3
Max			103.0	105.0	93.7	89.3	99.7	106.0	93.3
T-Test									
Femme									
FICARD Moy.			68.88	68.44	64.94	75.32	71.86	67.94	65.32
Ect			10.7	12.0	11.7	10.4	10.4	9.2	3.8
N.			105	62	35	9	100	13	5
Méd.			67.0	66.0	63.0	75.4	71.0	65.7	65.4
Min			45.0	45.0	45.0	63.3	47.0	54.7	59.3
Max			96.7	95.3	92.3	95.3	97.3	87.7	71.7
T-Test						LP	PLj		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q19 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

Fréquence cardiaque selon le statut tensionnel – Rappel 2010

Seuil 140-90 – Selon le sexe

		Classification du statut tensionnel répondant							
	TOTAL	Hypertension traitée controlée	Hypertension traitée non controlée	... Hypertension systolique isolée non controlée	... Hypertension diastolique non controlée	Normotendu	Hypertendu non traité	... Hypertendu systolique non traité	... Hypertendu diastolique non traité
Tests aux seuils 95,99%	zZ	aA	bB	cC	dD	eE	fF	gG	hH
Homme									
Moyenne	66,26	65,76	66,91	65,19	74,79	67,13	64,31	61,16	69,97
ET	10,5	10,0	12,1	10,7	15,2	9,8	8,7	8,1	10,5
Effectif	267	97	73	40	9	67	30	17	5
Médiane	65,3	65,1	65,3	64,6	71,7	66,3	64,0	61,3	68,7
Min	40,3	40,3	43,0	43,0	58,3	45,3	41,0	41,0	54,3
Max	107,3	90,0	107,3	88,3	107,3	91,7	85,0	76,7	85,0
T-Test	g	g	g		gf	g			
Femme									
Moyenne	70,44	69,17	68,01	66,95	76,78	71,67	76,59	72,66	81,52
ET	10,9	10,4	10,2	9,9	9,3	9,7	16,1	11,4	23,5
Effectif	292	121	44	29	7	105	21	8	7
Médiane	68,7	67,9	66,4	66,7	81,3	70,7	76,0	73,6	75,7
Min	45,3	45,3	47,3	50,7	63,7	46,7	54,3	54,3	59,7
Max	120,0	100,0	98,3	98,3	87,7	100,5	120,0	90,3	120,0
T-Test					cba	cb	cba		

Base : Ensemble des individus ayant un appareil d'automesure

Q10 : Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension.

KANTAR HEALTH

3.5 Renoncer à certains soins et autres*

** Nouvelles questions du questionnaire de 2012*

Renoncer à des soins pour un problème financier – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q26 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ?

Renoncer à des soins pour un problème financier – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Oui	Eff	627	254	373	143	148	132	107	98	281	347
	%v	*18.1%*	*15.0%*	*21.1%*	*16.6%*	*16.9%*	*19.9%*	*18.9%*	*19.7%*	*16.2%*	*20.0%*
	Test	A		Az							H
Non	Eff	2780	1419	1361	715	714	519	450	383	1433	1348
	%v	*80.3%*	*83.6%*	*77.1%*	*82.9%*	*81.4%*	*78.5%*	*79.6%*	*77.1%*	*82.8%*	*77.8%*
	Test	BI	BZ		ge					Iz	
NR	Eff	54	23	31	5	15	10	9	16	17	38
	%v	*1.6%*	*1.4%*	*1.8%*	*0.6%*	*1.7%*	*1.6%*	*1.5%*	*3.2%*	*1.0%*	*2.2%*
	Test	C				c			Cz		H

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q26 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ?

Renoncer à des soins pour un problème financier – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Oui	Eff	627	344	284	156	106	39	10	101	75	14	12	27
	%v	*18.1%*	*16.6%*	*20.3%*	*19.1%*	*20.5%*	*15.6%*	*21.9%*	*22.4%*	*21.3%*	*25.5%*	*27.4%*	*21.3%*
	Test			A		a			Afz	a			
Non	Eff	2780	1695	1085	641	401	205	35	346	276	40	30	99
	%v	*80.3%*	*82.0%*	*77.9%*	*78.6%*	*77.4%*	*81.7%*	*74.5%*	*76.7%*	*78.0%*	*73.1%*	*70.5%*	*77.4%*
	Test		Bhed										
NR	Eff	54	29	25	19	11	7	2	4	2	1	1	2
	%v	*1.6%*	*1.4%*	*1.8%*	*2.4%*	*2.1%*	*2.7%*	*3.6%*	*0.9%*	*0.7%*	*1.4%*	*2.1%*	*1.2%*
	Test			i	ih								

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q26 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ?

Soins abandonnés – 2012



Base : Ensemble des individus ayant renoncés aux soins pour raison financières(n=627)

Q27 : Avez-vous renoncé à … ?

Soins abandonnés – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**627**	**254**	**373**	**143**	**148**	**132**	**107**	**98***	**281**	**347**
% horizontal		*100.0%*	*40.6%*	*59.4%*	*22.8%*	*23.6%*	*21.0%*	*17.0%*	*15.6%*	*44.7%*	*55.3%*
ST Au moins un	Eff	625	254	371	141	148	132	106	98	279	346
	%v	*99.6%*	*99.7%*	*99.5%*	*98.8%*	*100.0%*	*100.0%*	*99.2%*	*100.0%*	*99.4%*	*99.7%*
	Test										
l'achat de médicaments	Eff	142	49	93	40	37	35	20	10	73	69
	%v	*22.6%*	*19.2%*	*25.0%*	*27.9%*	*24.6%*	*26.9%*	*18.4%*	*10.7%*	*26.1%*	*19.8%*
	Test	G			G	G	G				
ST consultation dont chez un MG / spécialiste	Eff	219	83	136	62	60	47	32	18	117	102
	%v	*34.9%*	*32.6%*	*36.5%*	*43.3%*	*40.5%*	*35.8%*	*30.3%*	*18.0%*	*41.6%*	*29.5%*
	Test	G			Gf	G	G	g		I	
ST réalisation de soins dentaires / lunettes de vue / prothèses	Eff	486	208	278	116	116	107	80	68	230	256
	%v	*77.5%*	*81.9%*	*74.6%*	*81.1%*	*78.1%*	*81.3%*	*74.8%*	*69.4%*	*82.1%*	*73.8%*
	Test		b		g		g			i	
la réalisation d'une cure thermale	Eff	255	98	157	33	53	54	55	60	78	177
	%v	*40.6%*	*38.4%*	*42.1%*	*23.0%*	*35.4%*	*41.1%*	*52.0%*	*61.0%*	*27.8%*	*51.0%*
	Test	CH				c	C	CDz	CDZE		HZ
Paiement d'une mutuelle	Eff	72	33	39	14	20	20	11	7	33	39
	%v	*11.5%*	*12.8%*	*10.6%*	*9.7%*	*13.3%*	*15.5%*	*10.8%*	*6.7%*	*11.9%*	*11.2%*
	Test						g				
d'autres soins	Eff	108	40	68	25	39	25	9	9	58	49
	%v	*17.2%*	*15.8%*	*18.1%*	*17.8%*	*26.4%*	*19.1%*	*8.1%*	*9.6%*	*20.8%*	*14.2%*
	Test	Fg			f	FGz	fg			i	
Sr	Eff	3	1	2	2			1		2	1
	%v	*0.4%*	*0.3%*	*0.5%*	*1.2%*			*0.8%*		*0.6%*	*0.3%*
	Test										
Moy.		2.49	2.45	2.52	2.40	2.72	2.72	2.39	2.11	2.58	2.42
Ect.		1.63	1.66	1.60	1.51	1.69	1.84	1.56	1.34	1.64	1.61
Mediane		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mini		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maxi		9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	7.00	8.00	9.00	8.00
Base de la moyenne		625	254	371	141	148	132	106	98	279	346
Test		g				G	G				

Base : Ensemble des individus ayant renoncés aux soins pour raison financières(n=627)

Q27 : Avez-vous renoncé à … ?

Soins abandonnés – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholesterol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**627**	**344**	**284**	**156**	**106**	**39***	**10****	**101**	**75***	**14****	**12****	**27****
% horizontal		*100.0%*	*54.8%*	*45.2%*	*24.8%*	*16.9%*	*6.3%*	*1.6%*	*16.1%*	*12.0%*	*2.2%*	*1.8%*	*4.3%*
ST Au moins un	Eff	625	343	282	156	106	39	10	99	75	14	11	27
	%v	*99.6%*	*99.7%*	*99.4%*	*100.0%*	*100.0%*	*100.0%*	*100.0%*	*98.3%*	*98.8%*	*100.0%*	*92.7%*	*100.0%*
	Test												
l'achat de médicaments	Eff	142	91	51	28	18	6	4	20	15	3	3	3
	%v	*22.6%*	*26.6%*	*17.9%*	*17.7%*	*17.0%*	*14.3%*	*38.1%*	*20.2%*	*19.9%*	*18.9%*	*24.3%*	*9.9%*
	Test	I	LBdef										
ST consultation dont chez un MG / spécialiste	Eff	219	137	82	48	36	9	3	26	21	2	3	7
	%v	*34.9%*	*40.0%*	*28.8%*	*30.9%*	*33.6%*	*23.6%*	*30.3%*	*26.1%*	*27.7%*	*16.8%*	*26.8%*	*26.8%*
	Test		BHIjjid										
ST réalisation de soins dentaires / lunettes de vue / prothèses	Eff	486	276	210	113	73	30	9	79	62	11	6	19
	%v	*77.5%*	*80.3%*	*74.1%*	*72.5%*	*69.2%*	*77.8%*	*85.3%*	*78.1%*	*82.5%*	*75.7%*	*52.1%*	*69.2%*
	Test		e							ek			
la réalisation d'une cure thermale	Eff	255	92	162	89	64	21	4	55	42	7	6	18
	%v	*40.6%*	*26.9%*	*57.2%*	*57.3%*	*60.4%*	*53.2%*	*40.7%*	*54.2%*	*55.3%*	*52.7%*	*49.2%*	*67.3%*
	Test	A		AZ	AZ	AZ	A		Az	Az			AZ
Paiement d'une mutuelle	Eff	72	45	27	15	11	4	0	8	7	1		5
	%v	*11.5%*	*13.0%*	*9.7%*	*9.7%*	*10.3%*	*9.6%*	*4.3%*	*7.6%*	*9.2%*	*5.2%*		*17.1%*
	Test												
d'autres soins	Eff	108	60	48	33	24	6	3	13	9	3	1	2
	%v	*17.2%*	*17.4%*	*17.0%*	*21.1%*	*22.3%*	*16.0%*	*27.9%*	*13.3%*	*11.7%*	*24.2%*	*10.4%*	*7.1%*
	Test				I	I							
Sr	Eff	3	1	2					2	1		1	
	%v	*0.4%*	*0.3%*	*0.6%*					*1.7%*	*1.2%*		*7.3%*	
	Test												
Moy.		2.49	2.49	2.50	2.51	2.62	2.27	2.39	2.49	2.65	2.04	1.98	2.40
Ect.		1.63	1.67	1.56	1.54	1.66	1.28	0.88	1.65	1.70	1.40	1.35	1.37
Médiane		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.18	1.26	2.00
Mini		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maxi		9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	6.00	6.00
Base de la moyenne		625	343	282	156	106	39	10	99	75	14	11	27
Test													

Base : Ensemble des individus ayant renoncés aux soins pour raison financières(n=627)

Q27 : Avez-vous renoncé à … ?

Situations de précarité – 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q28 : Vous est-il arrivé dans votre vie … ?

Score Situations de précarité



Somme des Oui à Q28 – Oui = 1
Score de 0 (aucune situation de précarité):
Score de 1 ou 2 (a connu des situations de précarité):
Score de 3 ou 4 (a connu des situations de grande précarité):

Q28 : Vous est-il arrivé dans votre vie … ?

Situations de précarité – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		**3462**	**1697**	**1765**	**862**	**877**	**661**	**566**	**496**	**1730**	**1732**
% horizontal		*100.0%*	*49.0%*	*51.0%*	*24.9%*	*25.3%*	*19.1%*	*16.3%*	*14.3%*	*50.0%*	*50.0%*
Aucune situation de précarité	Eff	2073	1110	964	461	495	366	387	364	961	1112
	%v	*59.9%*	*65.4%*	*54.6%*	*53.5%*	*56.5%*	*55.4%*	*68.4%*	*73.3%*	*55.6%*	*64.2%*
	Test	BCHe	BZ					CEDZ	CDEZ		HZ
A connu des situations de précarité	Eff	1126	484	642	331	295	253	156	91	621	504
	%v	*32.5%*	*28.5%*	*36.3%*	*38.4%*	*33.6%*	*38.3%*	*27.5%*	*18.3%*	*35.9%*	*29.1%*
	Test	GAif		AZ	GFZd	Gf	GFZ	G		Iz	
A connu des situations de grande précarité	Eff	185	76	109	61	74	33	10	7	127	58
	%v	*5.4%*	*4.5%*	*6.2%*	*7.1%*	*8.4%*	*5.0%*	*1.8%*	*1.5%*	*7.4%*	*3.4%*
	Test	GFI		a	GF	GFZE	GF			IZ	
Nr	Eff	78	27	51	9	13	9	13	34	21	57
	%v	*2.2%*	*1.6%*	*2.9%*	*1.0%*	*1.5%*	*1.3%*	*2.3%*	*6.9%*	*1.2%*	*3.3%*
	Test	CH		a					CEDZF		Hz
Moy.		0.61	0.52	0.69	0.74	0.72	0.67	0.41	0.28	0.72	0.49
Ect.		0.91	0.87	0.95	0.98	1.03	0.92	0.71	0.62	1.00	0.80
Médiane											
Mini											
Maxi		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Base de la moyenne		3384	1670	1715	854	864	652	553	462	1709	1675
Test		GFIA		AZ	GFZ	GFZ	GF	G		IZ	

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Situations de précarité – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Aucune situation de précarité	Eff	2073	1200	873	529	334	170	25	280	226	30	24	63
	%v	*59.9%*	*58.0%*	*62.6%*	*64.9%*	*64.5%*	*67.8%*	*53.6%*	*62.2%*	*64.0%*	*54.8%*	*56.8%*	*49.8%*
	Test	I		LA	ALZ	LAz	LAz		I	La			
A connu des situations de précarité	Eff	1126	703	423	231	145	67	19	140	106	19	15	51
	%v	*32.5%*	*34.0%*	*30.3%*	*28.4%*	*28.0%*	*26.9%*	*40.8%*	*31.1%*	*30.0%*	*35.1%*	*34.8%*	*40.3%*
	Test	de	DEfb										FEdbi
A connu des situations de grande précarité	Eff	185	126	59	39	28	8	3	15	10	3	2	5
	%v	*5.4%*	*6.1%*	*4.2%*	*4.8%*	*5.4%*	*3.3%*	*5.6%*	*3.3%*	*2.9%*	*5.1%*	*4.5%*	*4.1%*
	Test	ih	IHbf										
Nr	Eff	78	39	39	16	11	5		15	11	3	2	7
	%v	*2.2%*	*1.9%*	*2.8%*	*2.0%*	*2.1%*	*2.1%*		*3.4%*	*3.1%*	*5.1%*	*3.9%*	*5.8%*
	Test												
Moy.		0.61	0.65	0.55	0.54	0.56	0.47	0.74	0.51	0.48	0.66	0.66	0.71
Ect.		0.91	0.94	0.87	0.89	0.92	0.81	0.93	0.82	0.77	0.95	0.97	0.87
Mediane													
Mini													
Maxi		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Base de la moyenne		3384	2029	1355	800	507	245	47	435	343	52	41	120
Test		IFhb	IFBHD										ifh

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Situation actuelle - 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q29 : Quelle est votre situation actuelle?

Situation actuelle – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		3462	1697	1765	862	877	661	566	496	1730	1732
% horizontal		100.0%	49.0%	51.0%	24.9%	25.3%	19.1%	16.3%	14.3%	50.0%	50.0%
Travail à temps complet	Eff	1323	828	495	624	572	126			1323	
	%v	38.2%	48.8%	28.0%	72.4%	65.2%	19.1%			76.4%	
	Test	EB	BZ		EZD	EZ				Z	
ST Temps partiel	Eff	227	44	182	91	103	33			227	
	%v	6.5%	2.6%	10.3%	10.5%	11.8%	5.0%			13.1%	
	Test	A		AZ	EZ	EZ				Z	
Travail à temps partiel non choisi	Eff	58	9	49	16	35	7			58	
	%v	1.7%	0.5%	2.8%	1.8%	4.0%	1.0%			3.4%	
	Test	A		Az		EZC				Z	
Travail à temps partiel choisi	Eff	169	35	134	75	68	26			169	
	%v	4.9%	2.1%	7.6%	8.7%	7.7%	3.9%			9.7%	
	Test	A		AZ	EZ	EZ				Z	
Chômage	Eff	103	39	64	37	44	22			82	21
	%v	3.0%	2.3%	3.6%	4.3%	5.0%	3.4%			4.7%	1.2%
	Test	I		a		z				IZ	
Retraite ou Préretraite	Eff	1518	726	793	7	31	427	563	490	34	1484
	%v	43.9%	42.8%	44.9%	0.8%	3.5%	64.7%	99.5%	98.8%	2.0%	85.7%
	Test	CHD				C	CDZ	CDZE	CDZE		HZ
Autre	Eff	291	60	231	104	126	52	3	6	65	226
	%v	8.4%	3.5%	13.1%	12.0%	14.4%	7.9%	0.5%	1.2%	3.7%	13.1%
	Test	FGAH		AZ	FGZE	FGZE	FG				HZ

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q29 : Quelle est votre situation actuelle?

Situation actuelle - 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholesterol Ff	1 seule Pathologie: Diabete Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabete Jj	2 Pathologies: Cholesterol et Diabete Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Travail à temps complet	Eff	1323	1077	245	183	121	44	17	50	35	6	9	13
	%v	*38.2%*	*52.1%*	*17.6%*	*22.4%*	*23.4%*	*17.6%*	*37.1%*	*11.1%*	*9.9%*	*11.2%*	*21.1%*	*9.9%*
	Test	IHLBLDFEJBHIDLEFZJKg		IHL	IHLBj	IHLBJ	Ihl	IHLJBFd					
ST Temps partiel	Eff	227	174	52	39	32	5	2	11	7	3	1	3
	%v	*6.5%*	*8.4%*	*3.8%*	*4.7%*	*6.2%*	*1.8%*	*3.7%*	*2.4%*	*2.0%*	*4.9%*	*2.7%*	*2.3%*
	Test	IFHBLd	IHFBLDzk	if	IFh	IFHIb							
Travail à temps partiel non choisi	Eff	58	42	16	13	11	1	1	3	2		1	
	%v	*1.7%*	*2.0%*	*1.1%*	*1.6%*	*2.1%*	*0.4%*	*1.5%*	*0.7%*	*0.6%*		*2.7%*	
	Test	Fih	FIHb		f	fi							
Travail à temps partiel choisi	Eff	169	132	37	26	21	4	1	8	5	3		3
	%v	*4.9%*	*6.4%*	*2.6%*	*3.2%*	*4.1%*	*1.4%*	*2.3%*	*1.7%*	*1.4%*	*4.9%*		*2.3%*
	Test	IHFBd	IHBFDLze		i	ifh							
Chômage	Eff	103	71	32	24	17	4	3	7	5	2		1
	%v	*3.0%*	*3.5%*	*2.3%*	*2.9%*	*3.3%*	*1.5%*	*5.9%*	*1.6%*	*1.5%*	*3.5%*		*0.8%*
	Test	Lih	LHIfb		I	I							
Retraite ou Préretraite	Eff	1518	540	978	518	320	173	24	359	291	41	27	102
	%v	*43.9%*	*26.1%*	*70.2%*	*63.5%*	*61.8%*	*68.2%*	*51.2%*	*79.7%*	*82.2%*	*75.0%*	*64.7%*	*79.7%*
	Test	A		AZEDg	AZ	AZ	AZge	A	AZDEBGFk	AZDEBGFk	AZge	AZ	AZEDGbf
Autre	Eff	291	205	86	53	27	25	1	24	16	3	5	9
	%v	*8.4%*	*9.9%*	*6.2%*	*6.5%*	*5.2%*	*9.9%*	*2.1%*	*5.3%*	*4.5%*	*5.4%*	*11.5%*	*7.3%*
	Test	IGEBH	IBEHGD		g		Gieh						

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q29 : Quelle est votre situation actuelle?

Prise en charge à 100% - 2012



Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q30 : Avez-vous une prise en charge à 100% ?

Prise en charge à 100% – 2012

Selon l'âge, le sexe et l'activité

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Sexe: Homme Aa	Sexe: Femme Bb	Age: 35-44 ans Cc	Age: 45-54 ans Dd	Age: 55-64 ans Ee	Age: 65-74 ans Ff	Age: 75 ans et plus Gg	PCS Individu: Actifs Hh	PCS Individu: Inactifs Ii
Base		3462	1697	1765	862	877	661	566	496	1730	1732
% horizontal		100.0%	49.0%	51.0%	24.9%	25.3%	19.1%	16.3%	14.3%	50.0%	50.0%
ST Oui	Eff	2211	1169	1042	588	541	418	353	309	1123	1088
	%v	63.9%	68.9%	59.0%	68.2%	61.7%	63.3%	62.5%	62.4%	64.9%	62.8%
	Test	B	BZ		Dzfge						
Oui, par une mutuelle	Eff	1593	863	729	519	408	274	205	187	944	649
	%v	46.0%	50.9%	41.3%	60.2%	46.5%	41.4%	36.3%	37.7%	54.6%	37.5%
	Test	IFGBe	BZ		FGZED	FGe				IZ	
St ALD	Eff	550	288	263	43	113	128	147	120	140	410
	%v	15.9%	17.0%	14.9%	5.0%	12.8%	19.3%	26.0%	24.1%	8.1%	23.7%
	Test	CHd				C	CDz	CDZE	CDZ		HZ
Oui, par une ALD pour l'Hypertension	Eff	145	77	68	1	18	36	54	36	19	125
	%v	4.2%	4.5%	3.9%	0.1%	2.1%	5.5%	9.5%	7.2%	1.1%	7.2%
	Test	CHD				C	CD	CDZE	CDz		HZ
Oui, par une ALD pour le diabète	Eff	101	62	38	5	22	25	26	23	30	70
	%v	2.9%	3.7%	2.2%	0.6%	2.5%	3.8%	4.6%	4.6%	1.8%	4.1%
	Test	CH	B			C	C	Cd	Cd		Hz
Oui, par une ALD pour une autre maladie	Eff	305	149	156	37	73	66	68	61	91	214
	%v	8.8%	8.8%	8.8%	4.3%	8.3%	10.0%	12.0%	12.3%	5.3%	12.4%
	Test	CH				C	C	Cdz	Cdz		HZ
Oui, par la CMU	Eff	68	18	50	27	21	17	1	3	38	30
	%v	2.0%	1.1%	2.8%	3.1%	2.4%	2.5%	0.1%	0.5%	2.2%	1.7%
	Test	FGA		A	FG	FG	FG				
Non	Eff	1212	509	703	270	326	239	205	172	594	618
	%v	35.0%	30.0%	39.8%	31.3%	37.2%	36.1%	36.2%	34.7%	34.3%	35.7%
	Test	Ac		AZ		c					
NR	Eff	40	19	21	4	10	4	8	14	14	26
	%v	1.1%	1.1%	1.2%	0.4%	1.1%	0.6%	1.4%	2.9%	0.8%	1.5%
	Test	c							CEzd		

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q30 : Avez-vous une prise en charge à 100% ?

Prise en charge à 100% – 2012

Analyse selon le moustique de risque

Tests aux seuils 95 et 99%		TOTAL Zz	Moustique: Individu sain Aa	Moustique: Au moins une pathologie Bb	1 seule Pathologie: Total Dd	1 seule Pathologie: HTA Ee	1 seule Pathologie: Cholestérol Ff	1 seule Pathologie: Diabète Gg	2 Pathologies: Total Hh	2 Pathologies: HTA et Cholestérol Ii	2 Pathologies: HTA et Diabète Jj	2 Pathologies: Cholestérol et Diabète Kk	3 pathologies: Total Ll
Base		**3462**	**2068**	**1394**	**816**	**518**	**251**	**47***	**451**	**354**	**55***	**42***	**127**
% horizontal		*100.0%*	*59.7%*	*40.3%*	*23.6%*	*15.0%*	*7.2%*	*1.4%*	*13.0%*	*10.2%*	*1.6%*	*1.2%*	*3.7%*
Travail à temps complet	Eff	1323	1077	245	183	121	44	17	50	35	6	9	13
	%v	*38.2%*	*52.1%*	*17.6%*	*22.4%*	*23.4%*	*17.6%*	*37.1%*	*11.1%*	*9.9%*	*11.2%*	*21.1%*	*9.9%*
	Test	IHLDFEJBHIDLEFZJKg		IHL	IHLBj	IHLBJ	Ihl	IHLJBFd					
ST Temps partiel	Eff	227	174	52	39	32	5	2	11	7	3	1	3
	%v	*6.5%*	*8.4%*	*3.8%*	*4.7%*	*6.2%*	*1.8%*	*3.7%*	*2.4%*	*2.0%*	*4.9%*	*2.7%*	*2.3%*
	Test	IFHBLd	IHFBLDzk	if	IFh	IFHlb							
Travail à temps partiel non choisi	Eff	58	42	16	13	11	1	1	3	2		1	
	%v	*1.7%*	*2.0%*	*1.1%*	*1.6%*	*2.1%*	*0.4%*	*1.5%*	*0.7%*	*0.6%*		*2.7%*	
	Test	Fih	FIHb		f	fi							
Travail à temps partiel choisi	Eff	169	132	37	26	21	4	1	8	5	3		3
	%v	*4.9%*	*6.4%*	*2.6%*	*3.2%*	*4.1%*	*1.4%*	*2.3%*	*1.7%*	*1.4%*	*4.9%*		*2.3%*
	Test	IHFBd	IHBFDLze		i	ifh							
Chômage	Eff	103	71	32	24	17	4	3	7	5	2		1
	%v	*3.0%*	*3.5%*	*2.3%*	*2.9%*	*3.3%*	*1.5%*	*5.9%*	*1.6%*	*1.5%*	*3.5%*		*0.8%*
	Test	Lih	LHIfb		I	I							
Retraite ou Préretraite	Eff	1518	540	978	518	320	173	24	359	291	41	27	102
	%v	*43.9%*	*26.1%*	*70.2%*	*63.5%*	*61.8%*	*69.2%*	*51.2%*	*79.7%*	*82.2%*	*75.0%*	*64.7%*	*79.7%*
	Test	A		AZEDg	AZ	AZ	AZge	A	AZDEBGFk	AZDEBGFk	AZge	AZ	AZEDGbf
Autre	Eff	291	205	86	53	27	25	1	24	16	3	5	9
	%v	*8.4%*	*9.9%*	*6.2%*	*6.5%*	*5.2%*	*9.9%*	*2.1%*	*5.3%*	*4.5%*	*5.4%*	*11.5%*	*7.3%*
	Test	IGEBH	IBEHGD		g		Gieh						

Base : Ensemble des individus âgés de 35 ans et plus (n=3462)

Q30 : Avez-vous une prise en charge à 100% ?

KANTAR HEALTH

4. Annexes

KANTAR HEALTH

4.1 Caractéristiques de l'échantillon

Caractéristiques de l'échantillon – 2012

	Total n = 3462	Patients traités n = 1054 A	Patients non traités n = 2388 B
	%	%	%
Sexe			
• Hommes	49	49	49
• Femmes	51	51	51
Age			
• de 35 à 44 ans	25A	5	34 AZ
• de 45 à 54 ans	25A	16	30 AZ
• de 55 à 64 ans	19B	26 BZ	16
• 65 à 74 ans	16B	26 BZ	12
• 75 ans et plus	15B	27 BZ	8
Age moyen (ET)	*56.6 (14.5)*	*65.96 (12.2)*	*52.46 (13.4)*

Caractéristiques de l'échantillon – 2012

	Total n = 3462	Patients traités n = 1054 A	Patients non traités n = 2388 B
	%	%	%
CSP* du chef de famille			
• Agriculteur	1	<1	1
• Artisan, commerçant, chef d'entreprise	2A	<1	3A
• Cadre	10A	3	13AZ
• Profession intermédiaire	13A	6	16Az
• Employé	11A	8	13A
• Ouvrier	16A	10	19AZ
• Inactif	47B	73BZ	35
CSP* de l'interviewé			
• Agriculteur	<1	<1	<1
• Artisan, commerçant, chef d'entreprise	1A	<1	2A
• Cadre	9A	3	11AZ
• Profession intermédiaire	13A	6	16A
• Employé	16A	5	12A
• Ouvrier	11A	7	13Az
• Inactif	50B	74BZ	39

* CSP : Catégorie Socioprofessionnelle

Caractéristiques de l'échantillon – 2012

	Total n = 3462	Patients traités n = 1054 A	Patients non traités n = 2388 B
	%	%	%
Région UDA			
• Région Parisienne	17	17	17
• Nord	7	8	6
• Est	8	9	9
• Bassin Parisien	18	20 b	17
• Ouest	13	13	14
• Sud-Ouest	12	11	12
• Sud-Est	11	9	11
• Méditerranée	14	13	14
Catégorie d'agglomération			
• Ruraux	25	24	26
• De 2.000 à moins de 20.000 habitants	17	17	17
• De 20.000 à 100.000 habitants	14	14	13
• 100.000 habitants et plus	29	30	28
• Agglomération parisienne	15	15	16

KANTAR HEALTH

4.2 Lettre d’accompagnement

TNS

138 avenue Marx Dormoy
92129 Montrouge Cedex France

Montrouge, Le 4 juin 2012

Madame, Monsieur,

La société Kantar Health réalise pour le compte du Comité Français de Lutte contre l'HyperTension Artérielle (CFLHTA) une grande enquête nationale sur **l'hypertension artérielle au quotidien.**

Ce comité a pour mission de faire connaître les problèmes de l'hypertension artérielle au grand public et aux professionnels de santé.

Vous avez été choisi pour répondre à cette vaste étude sur l'HTA et nous vous demandons donc de répondre à une série de questions sur cette problématique.

Pour mener à bien cette étude, il est important que vous remplissiez vous-même le questionnaire en répondant à toutes les questions posées, si possible dès réception du formulaire, et que vous nous le retourniez avant le 29 juin 2012 à l'aide de l'enveloppe T ci-jointe.

Nous vous rappelons que les données contenues dans le questionnaire sont confidentielles et que vos réponses seront analysées de manière collective et anonyme conformément à la loi "Informatique et Liberté".

Pour toutes questions ou difficultés rencontrées pour remplir le questionnaire, n'hésitez pas à nous appeler au numéro vert suivant : 0800 36 90 58 (heures de bureau).

Nous souhaitons vous remercier par avance de votre participation à cette étude scientifique et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.

C. Dauphiez

KANTAR HEALTH

4.3 Questionnaire

TNS
138, avenue Marx Dormoy
92129 Montrouge Cedex - France
Tél. Vert : 0 800 36 90 58

Ce questionnaire est à remplir par :

Valeur questionnaire : 20 points

La vie quotidienne de l'hypertendu

⓪ Conformément aux recommandations de la CNIL, nous vous informons que le traitement des données sera effectué de manière anonyme et globale, par groupe, et jamais de façon individuelle.

Avant de commencer ce questionnaire, merci de nous confirmer votre accord sur le recueil et l'analyse par nos soins de données concernant votre santé. Nous vous rappelons que les données concernant votre santé ne seront jamais traitées de façon individuelle mais toujours de manière anonyme et agrégées à celles d'autres répondants.

- Oui, j'accepte de répondre à cette enquête ..... ☐
- Non, je refuse de répondre à cette enquête ..... ☐

Les médicaments que vous prenez

① Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter **l'hypertension artérielle** ? (*1 seule réponse*)

- Oui ..... ☐ → *Passez à* ②
- Non, mais vous avez déjà pris un traitement pour l'hypertension artérielle dans le passé..... ☐
- Non, vous n'avez jamais pris de traitement pour l'hypertension artérielle ..... ☐

} *Passez à* ⑥

② À partir de la **liste A** ci-jointe, reportez le ou les codes qui correspondent aux médicaments que vous prenez actuellement pour traiter l'hypertension artérielle. *(Plusieurs réponses possibles)*

☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐

Autre *précisez :* ☐

③ Depuis combien de temps prenez-vous un traitement pour traiter l'Hypertension Artérielle ?

☐☐ Mois ET ☐☐ Années

④ Actuellement, indiquez le nombre de médicaments pour l'Hypertension Artérielle qui vous sont délivrés sous une forme "générique" ?

- Inscrivez le nombre (01 ou plus) : ☐☐ → *Passez à* ⑤
- Aucun ..... ☐ → *Passez à* ⑥

⑤ Concernant le ou les médicament(s) pour l'Hypertension Artérielle qui vous sont délivrés sous une forme "générique" ?

Vous avez constaté en comparaison avec le "médicament de marque" **pour l'efficacité sur la tension :**

- Jamais de différence..... ☐
- Parfois une différence..... ☐
- Souvent une différence..... ☐

Vous avez constaté en comparaison avec le "médicament de marque" **pour les effets secondaires :**

- Jamais de différence..... ☐
- Parfois une différence..... ☐
- Souvent une différence..... ☐

KANTAR HEALTH

À TOUS

⑥ Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le **cholestérol** ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑦ Actuellement, prenez-vous un médicament pour traiter le **diabète** ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

Si vous prenez actuellement au moins un médicament pour traiter l'hypertension, et / ou le cholestérol et / ou le diabète répondez aux questions ⑧ à ⑬

⑧ Ce matin, avez-vous oublié de prendre un ou plusieurs de vos médicaments ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑨ Depuis la dernière consultation chez votre médecin, avez-vous manqué de médicaments ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑩ Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de prendre vos médicaments avec retard par rapport à l'heure habituelle ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑪ Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de ne pas prendre vos médicaments parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑫ Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

⑬ Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?

• Oui ..... ☐ • Non ..... ☐

Votre tension artérielle

⑭ Qui a effectué pour la dernière fois une mesure de votre tension artérielle ? *(1 seule réponse)*

• Un médecin généraliste ..... ☐ • Un pharmacien ..... ☐ • Vous-même ..... ☐
• Un médecin spécialiste ..... ☐ • Un infirmier(e) ..... ☐

⑮ Possédez-vous à votre domicile, un appareil pour mesurer la tension artérielle ? (*1 seule réponse*)

• Oui ..... ☐ → *Passez à ⑯*
• Non ..... ☐ → *Passez à ⑳*

⑯ Où se positionne l'appareil que vous utilisez personnellement pour mesurer votre tension artérielle ? Sur…
(*1 seule réponse*)

• Le poignet ..... ☐ • Le bras ..... ☐

KANTAR HEALTH

⑰ Actuellement, utilisez-vous l'appareil pour mesurer votre tension artérielle ?

- Tous les jours ..... ☐
- Plusieurs fois par semaine ..... ☐
- Une fois de temps en temps ..... ☐
- Uniquement quand vous ressentez des signes d'hypertension ..... ☐
- Avant une visite chez un médecin. ☐
- Pas d'utilisation depuis un long moment ..... ☐

⑱ Est-ce que d'autres personnes de votre entourage utilisent aussi l'appareil pour mesurer la tension artérielle ?

- Oui ..... ☐
- Non ..... ☐

⑲ Avec l'appareil que vous utilisez personnellement, mesurez votre tension en suivant les recommandations suivantes :

- le matin avant de débuter le petit-déjeuner,
- en **position assise**, après au moins 3 minutes de repos dans une ambiance calme,
- Il est demandé d'effectuer 3 mesures de suite. Un intervalle de 2 minutes en gardant la position assise est nécessaire entre chaque mesure.

Report des mesures de votre tension :

Tous les chiffres qui apparaissent sur l'écran sont à reporter dans le tableau ci-dessous.
Les chiffres de la partie supérieure de l'appareil indique la tension systolique (SYS) et de la partie inférieure de l'écran la tension diastolique (DIA). La fréquence cardiaque est aussi indiquée sur l'écran (PULSE).

	Votre tension artérielle		
	Tension systolique SYS mmHg	Tension diastolique DIA mmHg	Fréquence PULSE / min.
Matin			
Mesure 1	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
Mesure 2	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
Mesure 3	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐

Votre santé et votre situation au quotidien

⑳ Quelle est votre taille ? ☐ m ☐☐ cm

㉑ Quelle est votre poids ? ☐☐☐ kg

㉒ Quelle est votre tour de taille (mesurer avec un mètre de couturière à la hauteur du nombril) ?

☐ m ☐☐ cm

㉓ Actuellement, vous arrive-t-il de fumer, même **très occasionnellement** ?

- Oui ..... ☐
- Non ..... ☐

㉔ Dans le passé, avez-vous fumé, sur une période totale supérieure à une année ?

- Oui ..... ☐
- Non ..... ☐

KANTAR HEALTH

㉕ Dans le passé, ou actuellement, avez-vous souffert, ou souffrez-vous, d'un des problèmes de santé suivants ?

	Oui	Non
• Infarctus cardiaque, angine de poitrine, angor	☐	☐
• Dilatation des artères (par ballonnet) ou pontage des artères du cœur	☐	☐
• Insuffisance cardiaque	☐	☐
• Accident cérébral (paralysie transitoire ou permanente)	☐	☐
• Artérite des membres inférieurs ou dilatation des artères (par ballonnet) ou pontage des artères des jambes	☐	☐
• Arythmie cardiaque, port d'un Pace-Maker	☐	☐
• Affection articulaire ou osseuse (arthrose, rhumatisme, mal de dos)	☐	☐
• Affection respiratoire (asthme, bronchite chronique, apnée du sommeil)	☐	☐
• Anxiété, dépression nerveuse	☐	☐
• Traumatisme de type fracture	☐	☐
• Cancer	☐	☐
• Problème de vue important (cataracte, glaucome, cécité)	☐	☐
• Autre (*précisez* : _____)	☐	☐

㉖ Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ?

• Oui ..... ☐ → *Passez à* ㉗ • Non ..... ☐ → *Passez à* ㉙

㉗ Avez-vous renoncé à... ?

	Oui	Non
• l'achat de médicaments	☐	☐
• une consultation d'un médecin généraliste	☐	☐
• une consultation d'un médecin spécialiste	☐	☐
• la réalisation de soins dentaires	☐	☐
• la réalisation d'une cure thermale	☐	☐
• la réalisation de lunettes de vue	☐	☐
• la réalisation de prothèses auditives	☐	☐
• paiement d'une mutuelle	☐	☐
• d'autres soins	☐	☐

À TOUS

㉘ Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie... ?

	Oui	Non
• de devoir être hébergé chez des proches, par une association, dans un foyer d'hébergement	☐	☐
• d'avoir des difficultés à payer votre loyer, vos charges	☐	☐
• de connaître des périodes d'inactivité professionnelle d'au moins 6 mois	☐	☐
• de souffrir durablement d'isolement à la suite d'événements subis par vous ou vos proches	☐	☐

㉙ Quelle est votre situation actuelle ?

• Travail à temps complet ..... ☐ • Travail à temps partiel choisi ..... ☐ • Retraite ou Préretraite ..... ☐
• Travail à temps partiel non choisi. ☐ • Chômage ..... ☐ • Autre ..... ☐

㉚ Avez-vous une prise en charge médicale à 100% ?

• Oui, par une mutuelle ..... ☐ • Oui, par une ALD pour une autre maladie ..... ☐
• Oui, par une ALD pour l'Hypertension ..... ☐ • Oui, par la CMU ..... ☐
• Oui, par une ALD pour le diabète ..... ☐ • Non ..... ☐

Ce questionnaire est terminé - Merci de votre participation

KANTAR HEALTH

TNS
138, avenue Marx Dormoy
92129 Montrouge Cedex - France
Tél. Vert : 0 800 36 90 58

LISTE - La vie quotidienne de l'hypertendu

Liste A - Médicaments pour traiter l'hypertension artérielle - À utiliser pour la question 2

001	ACEBUTOLOL	044	DILTIAZEM	087	NIFEDIPINE
002	ACUILIX	045	ECAZIDE	088	NISIS
003	ACUITEL	046	ENALAPRIL	089	NISISCO
004	ADALATE	047	ENALAPRIL/HCTZ	090	NITRENDIPINE
005	ALDACTAZINE	048	EUPRESSYL	091	ODRIK
006	ALDACTONE	049	EURELIX	092	OLMETEC
007	ALDOMET	050	EXFORGE	093	PERINDOPRIL
008	ALPRESS	051	FLODIL	094	PHYSIOTENS
009	ALTEIS	052	FLUDEX	095	PRACTAZIN
010	ALTEIS DUO	053	FORTZAAR	096	PRETERAX
011	ALTIZIDE SPIRONOLACTONE	054	FOZINOPRIL	097	PRITOR
012	AMLODIPINE	055	FUROSEMIDE	098	PRITORPLUS
013	AMLOR	056	HYPERIUM	099	QUINAPRIL
014	APROVEL	057	HYTACAND	100	RAMIPRIL
015	ATACAND	058	HYZAAR	101	RASILEZ
016	ATENOLOL	059	INDAPAMIDE	102	RASILEZ HCT
017	AXELER	060	INSPRA	103	RENITEC
018	BENAZEPRIL	061	IRBESARTAN HCTZ	104	RILMENIDINE
019	BIPRETERAX	062	ISOPTINE	105	SECTRAL
020	BISOPROLOL	063	KENZEN	106	SELOKEN
021	BRIEM	064	KERLONE	107	SEVIKAR
022	CADUET	065	LASILIX	108	SOPROL
023	CALDINE	066	LECARNIDIPINE	109	SOTALEX
024	CANDESARTAN HCTZ	067	LERCAN	110	SOTALOL
025	CAPTEA	068	LERCAPRESS	111	SPIROCTAZINE
026	CAPTOPRIL	069	LISINOPRIL	112	SPIRONOLACTONE
027	CARDENSIEL	070	LISINOPRIL/HCTZ	113	TAREG
028	CATAPRESSAN	071	LODOZ	114	TARKA
029	CELECTOL	072	LOGIMAX	115	TEMERIT
030	CELIPROLOL	073	LOPRESSOR	116	TENORETIC
031	CHRONADALATE	074	LOPRIL	117	TENORMINE
032	CIBACENE	075	LOSARTAN	118	TENSTATEN
033	CILALZAPRIL	076	LOXEN	119	TEVETEN
034	COAPROVEL	077	MEDIATENSYL	120	TRANDATE
035	COKENZEN	078	METOPROLOL	121	TRANDOLAPRIL
036	COOLMETEC	079	MICARDIS	122	TRIATEC
037	CO-RENITEC	080	MICARDISPLUS	123	TWYNSTA
038	COTAREG	081	MODAMIDE	124	VALSARTAN HCTZ
039	COTRIATEC	082	MODURETIC	125	ZANEXTRA
040	COVERAM	083	MONO TILDIEM	126	ZANIDIP
041	COVERSYL	084	NEBILOX	127	ZESTORETIC
042	COZAAR	085	NICARDIPINE	128	ZESTRIL
043	DETENSIEL	086	NIDREL		

NE PAS RENVOYER À TNS